

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato: 20. december 2004
Kontor: 3.s.kt.
J.nr.: 2004-1441-43
Sagsbeh.: HM
Fil-navn: aids/pol/svarspm46

Besvarelse af spørgsmål nr. 46 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 28. oktober 2004

Spørgsmål 46:

"Der ønskes en vurdering af danskernes gennemsnitlige kendskabsniveau til AIDS i henholdsvis 1993, 1998 og 2003."

Svar:

Jeg har af Sundhedsstyrelsen fået oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"Sundhedsstyrelsen har gennemført en aids-kampagnemåling i 1993, hvor der bl.a. blev spurgt til viden om hiv/aids. Desuden har Sundhedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af befolkningens viden og holdning til hiv og aids i 1996. I 2003 blev en undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, seksygdomme og hiv gennemført. Det er disse undersøgelser der tages udgangspunkt i, i besvarelsen af spørgsmålet. Da Sundhedsstyrelsen ikke har gennemført sådanne undersøgelser i 1998, inddrages i stedet undersøgelsen fra 1996 i besvarelsen.

Et gennemgående spørgsmål i alle undersøgelser har været kendskab til smitemåder. Her viser undersøgelserne, at følgende andele i 1993, 1996 og 2003 mente, at der var "stor" eller "nogen" risiko for smitte ved eksempelvis:

Sæd

1993:	87%
1996:	87%
2003:	81%

Blod

1993:	97%
1996:	95%
2003:	94%

Toiletter/toiletsæder

1993:	14%
1996:	17%
2003:	4%

En gennemgang af undersøgelserne viser, at befolkningens viden om smittemåder har været nogenlunde stabil, og endda er forbedret på nogle områder. Det er værd at bemærke, at de unge mellem 15 – 19 år i 2003 havde et kendskab til hiv/aids, som var mindst ligeså godt som de 15 – 19-åriges var i 1996 og 1993. Dette på trods af, at der ikke siden 1996 var gennemført store befolkningsrettede kampagner. Undersøgelsen fra 2003 viste ligeledes, at mere end 90% i alle aldersgrupper vidste, at brug af kondom beskyttede mod hiv-smitte.

Statens Serum Institut har desuden i samarbejde med Stop Aids gennemført undersøgelser af sexlivet blandt mænd, der har sex med mænd. Disse undersøgelser har vist, at 98% af mænd, der har sex med mænd, var vidende om, at den sikreste måde at have sex på, var at bruge kondom og glidecreme. Alligevel havde 27% af respondenterne haft usikker sex inden for de sidste 12 måneder.

Dette illustrerer, at selvom viden må antages at være en væsentlig forudsætning for adfærdsændringer, er det ikke tilstrækkeligt til i sig selv at sikre adfærdsændringer. Andre forhold, herunder normer, præferencer, formodninger, risikovurdering og -villighed, magtforhold og adgang til prævention i de konkrete situationer har ligeledes betydning for valg og brug af præventionsmidler.”