

**TIL DIG, DER
ER SMITTET
MED KLAMYDIA**

Hver anden kvinde med klamydia får ingen symptomer.

- * Svie og smerter ved vandladning
- * Unormalt meget og gulligt udfald
- * Blødning uden for den almindelige menstruation og blødning efter samleje
- * Underlivssmerter hele tiden eller måske kun ved samleje
- * Stærke underlivssmerter og feber (underlivsbetændelse)

Symptomerne er typisk:

HVAD ER SYMPTOMERNE HOS KVINDER?

urinrørret med en vatpind.

Hos kvinder består testen i en lille prøve slim fra livmoderhalsen og urinrørret, der bliver taget med en vatpind. Hos mænd tages almindeligvis en urinpåvåg, men i nogle tilfælde tages prøven i

- * du har haft sex uden kondom
- * du eller din kæreste har symptomer på klamydia

diatøst hos din læge hvis:

Du kan have klamydia uden at vide det. Så få foretaget en klamy-

KLAMYDIA?

HVORDAN FINDER JEG UD AF, OM JEG HAR

HVAD ER KLAMYDIA?

Klamydia er en bakterie. Hos kvinder sætter klamydiabakterien sig i livmoderhalsen i toppen af skøden, men den kan også findes i urinrørret. Hos mænd sætter klamydiabakterien sig i urinrørret. Både kvinder og mænd risikører, at bakterien spreder sig til andre områder i underlivet og giver betændelse.

HVAD ER SYMPTOMERNE HOS MÆND?

Symptomerne er typisk:

- * Udfald og kløe ved urinrørret
- * Svie og smerter ved vandladning
- * Udfald ved endetarmsåbningen

Mindre end halvdelen af mænd med klamydia får symptomer.

HVORDAN SMITTER KLAMYDIA?

Klamydia smitter fra person til person ved samleje uden brug af kondom. Klamydiabakterien smitter let, og derfor er sygdommen meget udbredt. Lige nu har op mod 50.000 unge klamydia. Det svarer til hver 10. Men klamydia giver ofte ingen symptomer. Derfor kan du have klamydia uden at mærke det. Ligesom du kan smitte andre uden at vide det.

HVORDAN UNDGÅR JEG KLAMYDIA?

Kondom beskytter mod klamydia, hvis du bruger det under hele samlejet.

VIL DU VIDE MERE?

Klik ind på www.klamydia.dk. Du kan også ringe til Sex-linien 70 20 22 66 eller AIDS-linien 33 91 11 19. Flere eksemplarer af denne pjeces kan fås på www.sst.dk/udgivelser

HVAD SKER DER, HVIS KLAMYDIA IKKE BEHANDLES?

Ubehandlet klamydia kan have alvorlige følger for kvinder, der risikerer:

- * Underlivsbetændelse
- * Ufrivillig barnløshed
- * Kroniske underlivssmerter
- * Graviditet uden for livmoderen

Klamydia kan også forringe kvinders evne til at få børn, hvis infektionen ikke behandles. En graviditet uden for livmoderen kan ikke gennemføres og kan tilmed være farlig.

For mænd kan det være meget ubehageligt at have klamydia, men sygdommen har ikke så alvorlige følger. Kun få mænd får betændelse i bitestiklerne med hævelse og feber som følge af sygdommen.

HVEM HAR SMITTET MIG?

Du kan have haft klamydia i lang tid, inden du har opdaget sygdommen. Derfor kan det være svært at vide, hvem du er blevet smittet af. Har du symptomer, vil de som regel tidligst være kommet 2-3 uger efter, du er blevet smittet.

HVORDAN UNDGÅR JEG KLAMYDIA I FREMTIDEN?

Kondom beskytter mod klamydia, hvis du bruger det under hele samlejet.

VIL DU VIDE MERE?

Klik ind på www.klamydia.dk. Du kan også ringe til Sex-linien 70 20 22 66 eller AIDS-linien 33 91 11 19. Flere eksemplarer af denne pjeces kan fås på www.sst.dk/udgivelser

HVORDAN BLIVER JEG BEHANDLET?

I langt de fleste tilfælde er klamydiabakterien nem at komme af med. Din læge giver dig en recept på den medicin, du skal tage, og som regel vil du være rask efter 14 dage. Hvis du har symptomer, og de ikke forsvinder 1-2 uger efter behandlingen, skal du undersøges igen hos din læge.

HVORDAN MED SEX, NÅR JEG HAR KLAMYDIA?

Du skal bruge kondom i 14 dage efter, du har startet behandlingen. Har du stadig symptomer, skal du fortsat bruge kondom.

ER KÆRESTEN SMITTET?

Klamydia smitter nemt. Der er derfor stor sandsynlighed for, at din kæreste også har klamydia. Sørg for at fortælle, at du har klamydia, så din kæreste bliver undersøgt og behandlet samtidig med dig. Hvis du selv bliver behandlet, men din smittede kæreste ikke gør, kan du få klamydia igen. Har du haft andre partnere inden for de sidste 6-12 måneder, skal den eller de personer også have besked. Når du giver besked videre, er du med til at forhindre, at klamydia spreder sig. Hvis du ikke selv vil, kan du få lægen til at kontakte dine partnere.