

LÆGEMIDDEL
STYRELSEN



Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Hanne Bonne-Jørgensen
Sendes med e-mail

Kopi til Hanne Christensen, Sundhedsstyrelsen

Bidrag til besvarelse af spørgsmål nr. 60 fra Folketingets Sundhedsudvalg om rapport vedrørende biologiske lægemidler

Lægemiddelstyrelsen er blevet anmodet om en udtalelse om status på forbruget af biologiske lægemidler til behandling af leddegigt.

Der anvendes 4 biologiske lægemidler i behandlingen af leddegigt:

- Enbrel® (ATC L04AA11),
- Remicade® (ATC L04AA12),
- Kineret® (ATC L04AA14) og
- Humira® (ATC L04AA17).

Alle lægemidlerne er begrænset til brug på sygehuse.

Anvendelsen af disse lægemidler har været stigende i de seneste år, jf. tabel 1 og 2. Mængdeforbruget er opgjort i definerede døgndoser.

Tabel 1, Mængdeforbrug af Enbrel, Humira, Kineret og Remicade, 1999 – 3. kvartal 2004 (DDD)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Enbrel					39.572	123.217
Humira					15.007	93.158
Kineret				7.098	10.605	3.857
Remicade	9.467	74.481	163.709	261.977	362.378	337.071
	9.467	74.481	163.709	269.075	427.562	557.303

9. december 2004

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Journal nr:
1121-239
Vor ref:


Tlf: 44 88 95 95
Man-tor 8.30 - 16.00
Fre 8.30 - 15.30
Fax: 44 88 95 99
E-mail: dkma@dkma.dk
Internet:
www.laegemiddelstyrelsen.
dk

Tabel 2, Omsætning af Enbrel, Humira, Kineret og Remicade, 1999 – 3. kvartal 2004 (Kr.)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Enbrel					17.022.550	53.230.341
Humira					6.614.242	41.651.413
Kineret				2.237.879	3.402.261	1.249.746
Remicade	2.062.588	15.602.805	32.914.684	52.381.444	72.594.140	66.894.657
	2.062.588	15.602.805	32.914.684	54.619.323	99.633.193	163.026.156

Opgøres forbruget efter sygehusenes geografiske beliggenhed, ses en forskel mellem Øst- og Vestdanmark. Der er ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af det frie sygehusvalg. Fyns Amt er kategoriseret under Vestdanmark.

Figur 1. Forbruget af Enbrel, Humira, Kineret og Remicade, 1999 – 3. kvartal 2004 fordelt på Øst- og Vestdanmark (DDD pr. 1000 indbyggere)



I opgørelsen indgår det samlede forbrug af de pågældende lægemidler, uanset hvilken indikation, de er anvendt på. Der kan være usikkerhed i sammenligningen af forbruget mellem sygehusene og dermed geografiske områder af Danmark, idet lægemidlerne, og især Remicade®, kan anvendes til andre sygdomme end leddegigt, hvor doseringen kan være anderledes.

Med venlig hilsen

Pernille Fonnesbæk Rasmussen
Specialkonsulent