

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato:

Kontor: 3.s.kt.

J.nr.: 2005-12140-157

Sagsbeh.: LCH

Fil-navn: Dokument 2

Besvarelse af spørgsmål nr. 60 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 1. april 2005

Spørgsmål 60:

"Ministeren bedes oplyse hvilke fysiske og psykiske bivirkninger, der er forbundet med løbende medicinering af psykiatriske patienter set i forhold til bivirkningerne forbundet med medicinsk behandling i forbindelse med hyppige tvangsindlæggelser, hvor der typisk anvendes meget høje doser i forhold til doseringen ved den løbende medicinering."

Svar:

Jeg har indhentet et svar fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

"For patienter med skizofreni tilstræbes en løbende medicinering, da 85-90 % af patienterne har gavn heraf. Ofte finder tvangsindlæggelserne sted, fordi der forud har været medicin- eller behandlingssvigt. Dette kan medføre, at det i nogle tilfælde er nødvendigt at påbegynde medicinering igen i forbindelse med indlæggelser.

Generelt kan antipsykotisk medicin medføre bivirkninger fra nervesystemet, fx i form af muskelstivhed og ufrivillige bevægelser. Dette er oftest forbigående, men det kan blive nødvendigt at behandle med bivirkningsmedicin.

De forskellige antipsykotiske lægemidler har en noget forskellig bivirkningsprofil. Bivirkninger er til dels dosisafhængige. Alt andet lige er kontinuerlig behandling i relation til bivirkningsforekomsten mest fagligt hensigtsmæssig, forudsat at der er indikation for kontinuerlig behandling. Det tilstræbes at give en dosis så lille som muligt tilpasset tilstanden og ud fra kendskabet til patienten. Det kan være nødvendigt at skifte præparat eller at reducere dosis."