

**DEN ALMINDELIGE DANSKE LÆGEFORENING**



Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67  
2300 København S

**KOPI**

Formanden  
9. marts 2006  
J. 2819.16-0  
S. 20040001.14

**Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza**

Sundhedsstyrelsen har den 9. februar 2006 udsendt et udkast til Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza.

Indledningsvis vil lægeforeningen pege på, at det er vanskeligt at forestille sig omfanget af en pandemisk influenza. Derfor bør en beredskabsplan også bygge på det eksisterende beredskab og kunne udbygges i takt med behovet for en indsats.

Mere konkret skal der peges på følgende:

I såvel den præpandemiske periode med konstateret smitte fra person til person samt i særdeleshed under en pandemi, vil en overvejende del af behandling og udredning af smittetilfælde skulle foregå hos praktiserende læger. Det anbefales, at patienter så vidt mulig tilses i eget hjem samt at tilstanden kontrolleres med daglige telefonsamtaler. I en pandemisk situation anbefales det, at alene personer tilhørende en risikogruppe henvender sig til egen læge. Dette vil kræve, at man i den konkrete situation kan afgrænse risikogrupper. Imidlertid må der formentlig trods hotlines m.m. forudses en betydelig mængde konsultationer fra bekymrede patienter udenfor risikogrupper.

Der vil således i tilfælde af en pandemi være en betydelig ekstra arbejdsbyrde i almen praksis i form af ekstra konsultationer, hjemmebesøg og telefonkonsultationer. Der savnes i planen en nærmere beskrivelse af, hvorledes man forestiller sig dette organiseret, og i hvilket regi problemerne skal løses.


Skønt der på nogle af de særlige isolationsstuer i sygehusvæsenet vil være mulighed for respiratorbehandling, savnes en beskrivelse af forholdsregler for isolation og forebyggelse af smittespredning ved behandling af respiratorkrævende patienter på intensivafdelinger. I denne sammenhæng skal det nævnes, at behandlingskapaciteten indenfor intensivafdelinger er begrænset, og allerede nu opleves der problemer med manglende kapacitet.

Der savnes en specifik omtale af behandling og indlæggelse af smittede børn.

Findes der sikkerhed for leverancer af beskyttelsesudstyr fx FFP3-masker? Dette er naturligvis en vigtig del for at beskytte sundhedspersonalet mod smitte. Lægeforeningen forventer, at de praktiserende læger er medregnet i den gruppe af nøglepersoner i sundhedsvæsenet, der vil blive vaccineret.

Diagram 5.4 s. 23 er uklart. I samme diagram refereres til en person, som både er kontaktperson og risikopatient. Det bør i diagrammet klarere fremgå, at en risikopatient refererer til kontaktpersonen i det øjeblik, der udvikles sygdomssymptomer.

Med venlig hilsen

  
Jens Winther Jensen