

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato:
Kontor: Kommunal sundhed
J.nr.: 2006-1431-242
Sagsbeh.: TRP
Fil-navn: Spm. 552 gravide misbr..doc

Besvarelse af spørgsmål nr. 552 (Alm. del), som Sundhedsudvalget har stillet til socialministeren den 8. september 2006

Spørgsmål 552:

"Ministeren bedes redegøre for udviklingen de seneste 10 år i antal gravide stof- og alkoholmisbrugere samt antal nyfødte børn med skader/bivirkninger som følge af moderens misbrug"

Svar:

Der er ingen undersøgelser foretaget af udviklingen i antallet af gravide alkoholmisbrugere de seneste 10 år.

Ligeledes er der heller ingen nyere samlede opgørelser over antallet af nyfødte børn med skader/bivirkninger som følge af moderens misbrug. En undersøgelse fra 1984 viste, at forekomsten af FAS var ca. 75 om året (1,3 pr. 1000 fødsler). Udenlandske undersøgelser skønner, at FAE forekommer 3 gange så hyppigt som børn med FAS.

Det er ikke altid muligt ved fødslen at stille diagnosen FAS eller FAE. I nogle tilfælde stilles diagnosen først i skolealderen, når barnet udviser alvorlige indlæringsmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser. Andre af disse børn vil aldrig få en alkoholrelateret diagnose, men vil være at finde blandt mange andre diagnoser, som fx forstyrrelse i aktivitets- og opmærksomhedsniveau (ADHD), retarderet psykomotorisk udvikling m.m.