

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato: 23. november 2006
Kontor: Regional sundhed
J.nr.: 2006-1445-34
Sagsbeh.: HM
Fil-navn: vacc/pneumokok/svarspm79

**Besvarelse af spørgsmål nr. 79 (Alm. del), som Folke-
tingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og
sundhedsministeren den 10. november 2006**

Spørgsmål 79:

"Kan ministeren bekræfte, at man kan antage, at cirka 6-7 pct. af tilfældene af otitis media, mellemørebetændelse, kan reduceres ved indførelse af pneumokokvaccination af børn under 2 år. Ministeren bedes endvidere oplyse om den samfundsmæssige gevinst ved en sådan reduktion i behandlingen af mellemørebetændelse hos den praktiserende læge?"

Svar:

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at det kan forventes at man kan reducere antallet af tilfælde af mellemørebetændelse ved indførelse af pneumokokvaccination i børnevaccinationsprogrammet. I Finland og USA har man vist, at vaccinen kan forebygge ca. 6 % af alle tilfælde af mellemørebetændelse.

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger og henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål nr. 75.