



# Beslutningsstøttesystem til reduktion af pesticidforbrug

## Udvikling af varsling for bladlus i efteråret

Ghita Cordsen Nielsen, Rolf Thostrup Poulsen  
& Poul Henning Petersen

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

# Indhold

<b>FORORD</b>	<b>5</b>
<b>SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER</b>	<b>7</b>
<b>SUMMARY AND CONCLUSIONS</b>	<b>9</b>
<b>1 INDLEDNING</b>	<b>11</b>
1.1 FORMÅL	12
<b>2 ETABLERING AF REGISTRERINGSNET</b>	<b>13</b>
2.1 BEDØMMELSER AF BLADLUS I MARKEN	13
2.2 INDSAMLING AF RESULTATER	14
2.3 KLIMAMODEL	18
2.4 INFORMATIONER TIL LANDMÆND	19
<b>3 INTERVIEWUNDERSØGELSE HOS LANDMÆND</b>	<b>20</b>
3.1 TOLKNING AF ANALYSERAPPORT	20
3.2 ANVENDELSE AF SMS-VARSLING	23
<b>4 BEDØMMELSER AF ANGREB AF HAVRERØDSOT</b>	<b>25</b>
4.1 TOLKNING AF DATA VEDRØRENDE AF HAVRERØDSOT	27
<b>5 PERSPEKTIVERING</b>	<b>29</b>
<b>6 LITTERATURLISTE</b>	<b>31</b>

Bilag A

Kort over udpegede områder

Bilag B

Spørgeskema brugt til interviewundersøgelse

Bilag C

Resultater af interviewundersøgelse, landmænd

Bilag D

Konsulentindberetninger

Bilag E

Spørgeskema brugt til konsulentindberetninger



# Forord

I forbindelse med evalueringen af Pesticidplan 2004-2009 er der gennemført en række projekter, der skal bidrage til en vurdering af mål og virkemidler. Dette projekt indgår som en del af evalueringen af virkemidler, der kan bidrage til at nedsætte anvendelsen af pesticider.

Et af midlerne til at reducere pesticidforbruget er at udbrede anvendelsen af beslutningsstøttesystemer som Planteværn Online, SMS-services mv. Ved et beslutningsstøttesystem forstås et informationssystem til vejledning i plantebeskyttelse, der på baggrund af risikobaseret varsel og/eller registreringer i marken kan anvise behandlinger mod specifikke skadenvoldere. Det kan typisk bestå af et eller flere varslingssystemer (der varsler om angreb af skadenvoldere, uden konkret vejledning til bekämpelse i hver enkelt mark), tilhørende skadetærskler (der fastlægger, ved hvilken angrebsgrad bekämpelse er rentabel) samt værktøjer, der giver konkret vejledning til, om der skal foretages bekämpelse og i givet fald giver forslag til middelvalg og dosering.

Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Projektet har haft en følgegruppe, der var fælles for dette og fire andre projekter, som havde forbindelse med evalueringen af pesticidplanen.

Følgegruppens medlemmer:

Anita Fjelsted (formand), Miljøstyrelsen  
Jørgen Schou og Lise Samsøe-Petersen, Miljøstyrelsen  
Annesofie Trydeman Knudsen, Finansministeriet  
Lene Mølsted Jensen og Lars Ole Hansen, Fødevareministeriet  
Aksel Nielsen, Plantedirektoratet  
Jesper Lund-Larsen, Fagligt Fælles Forbund 3F  
Helle Græsted Bennedsen, Dansk Planteværn  
Hans Nielsen, Det Økologiske Råd  
Anne Marie Zinck, Dansk Landbrug  
Allan Andersen, Danmarks Naturfredningsforening  
Carl Åge Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning  
Peter Esbjerg og Vibeke Langer, Københavns Universitet (KU-Life)

Projektet er gennemført af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion i samarbejde med planteavlkskonsulenter i Dansk Landbrugsrådgivning.

Medarbejdere hos Dansk Landbrugsrådgivning:  
Ghita Cordsen Nielsen  
Rolf Thostrup Poulsen  
Poul Henning Petersen



# Sammenfatning og konklusioner

Efter i 2007 at have oplevet et år med særdeles kraftige angreb af den bladlusoverførte virussygdom havrerødsot, er der opstået et ønske om at udvikle et beslutningsstøttesystem til at støtte den enkelte landmands vurdering af behovet for at bekæmpe bladlus i efteråret. Der blev derfor i efteråret 2007 i dette projekt oprettet et registreringsnet, hvor planteavlskonsulenter i risikoområder bedømte angrebene af bladlus i 40 vinterhvede- og 20 vinterbygmarker. Der forekom relativt mange bladlus, og bekämpelse blev derfor tilrådet i tidligt såede marker i risikoområder.

Ved bedømmelse af angreb af havrerødsot i de ubehandlede vinterbyg- og vinterhvedemarker i registreringsnettet i foråret 2008, blev det bekræftet, at bekämpelsen i mange tilfælde var nødvendig ud fra en vurderet skadetærskel på 1 % angrebne planter i vinterbyg og 2 % i vinterhvede. De lave skadetærskler indebærer, at der skal relativt små angreb til, før behandlingerne er rentable.

Klimadata blev benyttet til at vise bladlusgraddage ifølge en engelsk model. Denne model antager, at 2. generation bladlus om efteråret forekommer ved 340 graddage (basis 3° C). I England anbefales sprøjtning på dette tidspunkt. Antallet af graddage bliver opsummeret ud fra fremspiringstidspunktet i den enkelte mark. Da modellen ikke er testet under danske forhold, er i stedet løbende vist udviklingen i bladlusgraddage i efteråret 2007 i forhold til ”normalt”, d.v.s i efterårene 1961-90 + 0,7 °C (0,7 °C er temperaturforøgelsen fra 1961-90 til 1995-2004). Ud fra markens fremspiringstidspunkt blev udviklingen i graddage vist.

Efteråret 2007 var, ifølge DMI, ikke væsentligt forskellig fra normalen, hvad angår temperatur. I september var temperaturen normal, og der var mere nedbør og sol end normalt. Oktober var køligere end normalt, men tør og solrig. November var lidt varmere end normalt. Vinteren (december-februar) var væsentligt varmere end normalt, med en middeltemperatur på hele 4,1 °C, hvilket er 3,6 °C over normalen for perioden 1961-1990. Det forholdsvis normale efterår har betydet, at bladlusaktiviteten ikke har været stor de første måneder efter såning af vintersæden, dvs. september-oktober.

Skadetærsklen for angreb af havrerødsot har i risikoområder været overskredet i 24 procent af vinterhvedemarkerne og 41 procent af vinterbygmarkerne. Varslingen har gjort det muligt at målrette sprøjtingen mod bladlus i efteråret til de marker, hvor der har været størst risiko for angreb. En målrettet varslig har således været med til at forbruget af plantebeskyttelsesmidler har været lavere, end hvis man på grund af mangel på viden havde været nødt til generelt at forsikre sig mod angreb ved at sprøjte alle marker systematisk mod bladlus i efteråret.

For at kunne identificere de problemstillinger, landmanden står overfor i beslutningsfasen, blev der i maj 2008 udført en interviewundersøgelse hos en række landmænd bosat i områder med hhv. høj og lav risiko for angreb af havrerødsot. Undersøgelsen viser, at landmændene generelt er gode til selv at

kigge efter bladlus i deres marker, men også, at de samtidig med deres egne registreringer benytter sig af anden relevant information, inden de tager beslutning om bekämpelse. Med anden relevant information menes dialog med planteavlskonsulenter, læsning af nyhedsbreve, fagblade mm. Denne information bygger i øvrigt også i stor udstrækning på resultaterne af varslingen.

Sammenfattende viser projektet, at varsling er en væsentlig del af landmændenes beslutningsgrundlag. Oftest tages en beslutning om bekämpelse ud fra informationer fra flere informationskilder, egne erfaringer og registreringer i marken, samt beslutningsstøttemodeller som f.eks. Planteværn Online (PVO), forudsat de indeholder modeller for de pågældende skadenvoldere. PVO indeholder endnu ikke nogen model, der kan forudsige behovet for at bekæmpe bladlus om efteråret i vintersæd.

En målrettet varsling er således med til at forbruget af plantebeskyttelsesmidler bliver lavere, end hvis man på grund af mangel på viden er nødt til generelt at forsikre sig mod angreb ved systematisk at sprøjte mod den pågældende skadegører.

Projektet har også haft til formål at undersøge, om udsendelse af SMS er en effektiv metode til at målrette udsendelsen af varslingsresultaterne i tid og rum, så landmanden kun får informationen, hvis han har den afgrøde, varslingen drejer sig om, og netop på det tidspunkt, hvor han har brug for at vide, om der er behov for bekämpelse eller ej. Undersøgelsen viste, at varsling gennem SMS endnu har et beskedent omfang, men bekræfter, at der er et betydeligt potentiale for at varsle via SMS.

I principippet kan varslinger for bekämpelse af skadenvoldere udsendes af hvem som helst, herunder de firmaer, der sælger plantebeskyttelsesmidler og forskningsinstitutioner. Da det altid vil være nødvendigt med en vis grad af ekspertskøn, er det afgørende, at de personer, der skal foretage disse skøn, ikke har økonomisk eller karrieremæssig interesse i udfaldet af varslingen, og at de er nært relateret til praksis, praksisnære forsøg og kender landmændenes beslutningsadfærd.

## Summary and conclusions

After having experienced severe attacks of the aphid transmitted disease "barley yellow dwarf virus" (BYDV) in 2007, a desire to develop a decision support system to assist the farmer in deciding whether to spray for aphids or not in the autumn, has emerged. In the autumn of 2007, an early warning system was therefore established in connection with this project. In this system, the agricultural advisors assessed the scale of attack of aphids in 40 winter wheat fields and 20 winter barley fields. Because a relatively high amount of aphids were found, spraying was recommended in early sown fields, located in high risk areas.

By a visual assessment of BYDV in the unsprayed winter wheat and winter barley fields from the early warning system, in the spring of 2008, it was confirmed, that spraying in many cases were necessary, based on an evaluated threshold of 1 % attacked plants in winter barley, and 2 % in winter wheat. The low thresholds imply that it takes relatively small attacks, before spraying against aphids is cost-effective.

Climate data were used to show aphid day degrees, based on an English model. This model assumes that the second generation aphids occur at 340 day degrees (with a basis of 3°C). In England, spraying is recommended at this stage. The number of day degrees were summarized based on the time of germination in the individual field. Since the model is not tested under Danish conditions, the development in aphid day degrees in the autumn of 2007 was shown instead, relative to "normal autumns", that means the autumns 1961-90 + 0.7 °C (0.7 °C is the temperature increase from 1961-90 to 1995-2004). Based on the time of germination, the development in day degrees was shown.

According to DMI, the autumn of 2007 was not significantly different from the average with respect to temperature. In September the temperature was normal, and there was more rain and sun than normal. In October the temperature was lower than normal, but dry and sunny. November was a little bit warmer than normal. The winter was however significantly warmer than normal, with an average temperature of 4.1 °C, which is 3.6 °C higher than normal for the period 1961-1990. Because the temperatures in the beginning of the autumn (September-October) were fairly normal, the activity of the aphids was low in this period.

The threshold for BYDV was exceeded in 24 % of the winter wheat fields and 41 % of the winter barley fields located in the high risk areas. The early warning made it possible to target the spraying against aphids in the autumn to fields, where the risk of attack was high. A focused warning has therefore helped to ensure, that the consumption of plant protection products has been lower than if all fields systematically was sprayed as a precaution, due to lack of knowledge.

In order to identify the problems and challenges facing the farmers in the process of decision making, an interview study was performed in May 2008. The farmers included in the study either lived in an area with a low potential risk of BYDV or in an area with high risk. The study shows that farmers in

general are good at monitoring for aphids in their fields, but also that they use other relevant information as a support, before they decide to spray. Other relevant information include dialog with the advisors, newsletters, farm press, etc. This information is to a large extent dependent on results from the early warning system.

To sum up, this project shows that early warning is a significant part of the decision making process of the farmer. Often the decision to spray is based on information from several sources, own experiences and registrations in the field as well as decision support models such as Plant Protection Online (PVO), required that the system contains models for the pathogen in focus. PVO does, at the moment, not include any model capable of predicting the need for protection against aphids in the autumn in winter cereals.

A focused warning therefore helps to ensure, that the consumption of plant protection products is been lower than if all fields systematically is sprayed as a precaution, due to lack of knowledge.


Another objective of this project has also been to investigate whether SMS is an effective method to target the broadcasting of the results of the early warning in time and space, so that the farmer only receives the information valid for him in relation to e.g. crop and timing. The investigation confirms that there is a potential for early warning via SMS, but also that the potential is not yet fully exploited.

The early warning for control of pathogens can in principle be issued from anyone and anywhere, including the companies selling plant protection products and research institutions. As it will always be necessary with a certain degree of expert judgment, it is crucial that the persons making these judgments has no economical or career-wise interest in the outcome of the early warning, and that they are closely connected to practical agriculture, realistic experiments and know the decision-making behavior of the farmers.


# 1 Indledning

Havrerødsot er en virussygdom, der overføres til vintersæden af bladlus om efteråret. I 2007 optrådte de hidtil kraftigste angreb af havrerødsot i vinterhvede og vinterbyg i de mildeste områder af landet. Milde efterår og tidlig såning af vintersæden giver de kraftigste angreb, fordi bladlusene opformerer sig mest og er mest aktive i mildt vejr, og fordi bladlusene under disse forhold har længere tid til at overføre viruset, før kulden sætter en stopper for deres aktivitet. Virussygdommen har fået sit danske navn efter symptomerne på havre, hvor bladene rødfarves. Ved smitte i vintersæd om efteråret optræder angrebene i pletter i marken, hvor væksten er lavere. I vinterbyg dør de angrebne planter oftest i løbet af vinteren. I vinterhvede er udbyttetabet i angrebne pletter omkring 50 procent, fordi aksene bliver kortere og kernerne mindre (Planteavlsoorientering 09-831 og Huth 1990). Selv om smitten sker om efteråret, ses symptomerne først fra begyndende vækst i foråret.

Efteråret og især vinteren 2006 var det mildeste siden klimaregistreringerne startede, og var 3 grader højere end normalt. Dette vurderes at være årsagen til de hidtil kraftigste angreb af havrerødsot i vinterbyg og vinterhvede i Danmark i 2007. Se figur 1-2. Klimaændringer vil medføre større problemer med bladlus om efteråret og dermed havrerødsot. Århus Universitet, DJF har oplyst, at temperaturen i efterårene 1995-2004 er steget med 0,7 grader i forhold til 1960-1991.



**Figur 1. Middeltemperatur i efteråret (sept. - nov.) 2006**  
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).



**Figur 2. Middeltemperatur i efterårene (sept.-nov.) 1961-90**  
 (Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

Risikoen for udbredte angreb af havrerødsot er størst i kystnære og sydlige egne af landet, hvor en højere middeltemperatur om efteråret øger muligheden for at bladlus er aktive i vintersæden (figur 1 og 2). Angreb af havrerødsot kan forebygges ved at bekæmpe bladlus i september-oktober måned. For landmanden er det vanskeligt at vurdere om der skal sprøjtes eller ikke. Derfor er det interessant at undersøge, om et registrerings- og varslingsssystem kan bidrage til at målrette bekæmpelsen mod marker, hvor der er et økonomisk merudbytte for behandlingen.

### 1.1 Formål


Det har været projektets formål at demonstrere, at anvendelse af et registrerings- og varslingsssystem, baseret på LandbrugsInfo, en klimamodel og lokal videreförmedling kan bidrage til at holde forbruget af plantebeskyttelsesmidler så lavt som muligt for at kontrollere en ny betydende skadegører som havrerødsot. Endvidere har det med udgangspunkt i dette konkrete varslingsssystem været målet at vurdere, hvordan sådanne systemer mest hensigtsmæssigt kan organiseres.

## 2 Etablering af registreringsnet


### 2.1 Bedømmelser af bladlus i marken

I efteråret 2007 blev der etableret et registreringsnet for bladlus, hvor planteavlkskonsulenterne ugentligt registrerede bladlus i 40 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker. Markerne lå i de mest milde områder af landet, hvor der er størst risiko for angreb. Se figur 1-2. Der blev endvidere udvalgt tidligt såede marker (sået før 15. september), som er mest utsatte for angreb. I figur 3 ses det gennemsnitlige angreb af bladlus i ubehandlede vinterhvede- og vinterbygmarker i registreringsnettet, og i figur 4-5 angrebsstyrken af bladlus i de enkelte marker.


Der findes ikke nogen referenceværdi for, hvor mange bladlus der normalt forekommer i vintersæd om efteråret i Danmark. Da et varierende antal bladlus er smittebærere af viruset fra år til år og fra mark til mark, findes der heller ikke nogen vejledende bekämpelsestærskel. I England er fundet en sammenhæng mellem fugtige somre og antallet af bladlus i vintersæden om efteråret. Jo mere fugtig en sommer, jo flere bladlus. Årsagen vurderes at være, at bladlusenes værter (græs og spildkornsplanter) vokser bedst i fugtige somre. Sommeren 2007 var meget fugtig i Danmark. Vurderet i forhold til tyske erfaringer med forekomst af bladlus, blev der fundet relativt mange bladlus i mange af markerne og især i vinterbyg.



Figur 3. Oversigt over angreb af bladlus (procent angrebne planter) i ubehandlede vinterhvede- og vinterbygmarker i registreringsnettet i efteråret 2007.



**Figur 4. Angreb af bladlus i de enkelte vinterbygmarker i registreringsnettet på de angivne datoer.**




**Figur 5. Angreb af bladlus i de enkelte vinterhvedemarker i registreringsnettet på de angivne datoer.**

## 2.2 Indsamling af resultater

Indsamlingen af data fra de nævnte marker foregik i praksis ved at konsulenterne ugentligt tog ud i marken og bedømte procent planter angrebet af bladlus, ved at gå diagonalt over markerne. Resultaterne blev løbende indtastet på en hjemmeside specielt oprettet til formålet. Figur 6 viser som eksempel hjemmesiden, som den så ud for vinterbyg den 6. november, med to kort over Danmark. Det ene kort viser en oversigt over indkomne registreringer, fordelt på landet, mens det andet viser afgrødens udviklingstrin på registreringstidspunktet. Bedømmelserne forløb i perioden fra uge 39 (24.-

25. september) til og med uge 45 (5.-6. november). Det er muligt på hjemmesiden, at gå frem og tilbage i registreringerne, således at forløbet af angrebet kan følges over tid.



**Figur 6. Eksempel på hjemmesiden, hvor konsulenternes indberetninger til registreringsnettet i efteråret 2007 kunne følges. Denne side viser resultatet for vinterbyg, mens en tilsvarende side var oprettet for vinterhvede.**

På den samme hjemmeside, blev de enkelte registreringer vist i tabelform, således at der altid kunne findes tilbage til den præcise lokalitet samt tidspunkt for registrering. Nedenfor er vist registreringerne for vinterbyg. Fundene af bladlus har været en væsentlig del af grundlaget for varslingen til landmændene om, hvorvidt der burde sprøjtes eller ej. Valgte landmanden at sprøjte, blev der efterladt et usprøjtet område, med henblik på vurdering af angrebsgraden af havrerødsot i den ubehandlede mark det kommende forår. Der er derfor for mange af markerne både en registrering af bladlus i den sprøjtede og usprøjtede del af marken.

**Tabel 2.1. Eksempel på registreringer af bladlus, % angr. planter i vinterbyg**

Lokalitet	Postnr	Dag												
		30/10	29/10	28/10	27/10	26/10	25/10	24/10	23/10	22/10	21/10	20/10	19/10	18/10
<b>Fyns amt</b>														
Nr. Aaby Behandlet	5580 Nørre Aaby		0											
Nr. Aaby	5580 Nørre Aaby		14								14			
Ejby	5592 Ejby	11								10				
3	5900 Rudkøbing	10								3				
5932 Humble	5932 Humble													
<b>Ribe amt</b>														
Guldager- Esbjerg V	6710 Esbjerg V		0											
6710 Esbjerg V	6710 Esbjerg V		8											
<b>Ringkøbing amt</b>														
Engbjerg Sprøjtc	7620 Lemvig		0											
Engbjerg	7620 Lemvig		0							0				1



Sprojekt	Aabenraa																		
Vejle amt																			
Kragelund	8723 Løsning		0																
Vestjyllands amt																			
Vemmelev	4241																		
Vemmelev																			

Denne baggrundsfarve indikerer at lokaliteten er behandlet

En meget vigtig funktion af hjemmesiden har været den ugentlige kommentering fra Landscentret. Her blev der uge for uge fulgt op på registreringerne, således at landmændene og konsulenterne kunne holde sig opdaterede med udviklingen i fangsterne, og ikke mindst, om bekämpelse af bladlus blev tilrådet eller ej. I figur 7 er vist et eksempel på kommentarer for vinterbyg. Det ses, at der foruden den aktuelle situation også kommenteres på registreringen generelt, og på den mere historiske baggrund for nødvendigheden af registreringerne.

**Figur 7. Eksempel på den ugentlige kommentar til registreringerne i vinterbyg:**

**6. registrering uge 44 (29. oktober - 2. november)**

**Konklusion:** På baggrund af de mange fund af bladlus i registreringsnettet har mange bekæmpet bladlus i år. I denne uge er der yderligere bedømt i den sprøjtede del af markerne i registreringsnettet for at vurdere, om en enkelt behandling er tilstrækkelig. Markerne er typisk sprøjtet i 2-3-bladstadiet (i gennemsnit ca. 7. okt.). Det fremgår, at sprøjtningen generelt har haft god effekt. Der vurderes derfor ikke at være behov for en supplerende behandling, hvor der er behandlet fra omkring 2-3-bladstadiet. Ved en meget tidlig bekämpelse (1-bladstadiet) er virkningstiden af en bladlusbekämpelse kortere.

I registreringsnettet bedømmes i "risikomarker", dvs. marker i de mildeste områder af landet, hvor der i 2007 var udbredte angreb af havrerødsot, ligesom der bedømmes i tidligt såede marker (før 15. september). Fra praksis er også meldt om fund af bladlus i marker, som ligger længere væk fra kysten, og som er sået senere. Derfor er der opfordret til, at man generelt undersøger markerne for bladlus, og udfører en bekämpelse, hvis man har let ved at finde bladlus. Der findes ingen tærskel for bladlus i relation til havrerødsot, fordi et varierende antal bladlus bærer virussmitten.

**Bedømmelsen i næste uge er sidste bedømmelse i år.**

For at vurdere risikoen for angreb af havrerødsot, følger plantearvskonsulenterne fra slutningen af september og til ind i november forekomsten af bladlus i 20 vinterbygmarker. Der bedømmes i "risikomarker", det vil sige marker i de mildeste områder af landet (sydlige og kystnære områder), hvor der i 2007 var udbredte angreb af havrerødsot.

Se figur 1 i plantenytt nr. 437, 2007. Der bedømmes endvidere i marker sået før ca. 15. september, da tidligt såede marker er mest udsatte for angreb.

Som det fremgår af kortet og tabellen nedenfor, er der i år fundet overraskende mange bladlus i "risikomarker", hvorfor bladlusbekämpelse er tilrådet fra 2-3 bladstadiet. Der findes dog ingen "reference værdi" for antallet af bladlus i vintersæden om efteråret i Danmark. Der findes mørke vingede bladlus, se foto af bladlus, og også afkom i form af grønlige uvingede bladlus. I solskin kan bladlusene ses gennem bladet som en skygge, men ofte sidder der også mange bladlus ved stænglen i jordoverfladen.

I Slesvig Holsten har de også fundet relativt mange bladlus, og en væsentlig større andel af bladlusene end normalt indeholder virus. Bladlusene kan optage virus fra spildkornsplanter, græs og majs.

Selv om risikoen for angreb af havrerødsot i år er vurderet som relativt høj, kan køligt vejr i efteråret reducere bladlusenes aktivitet og dermed smittespredningen af havrerødsot. Ifølge litteraturen kan bladlus tåle +12° C, før de dør. Da vejrforholdene i efteråret dog ikke kan forudsiges, er bladlusbekämpelse i år anbefalet i risikomarker og i andre marker, hvor der relativt let kunne findes bladlus.

I denne uge er der yderligere bedømt i den sprøjtede del af markerne i registreringsnettet for at vurdere, om en enkelt behandling er tilstrækkelig. Markerne er typisk sprøjtet i 2-3 bladstadiet (ca. 7. oktober). Det fremgår, at sprøjtingen generelt har haft god effekt. Der vurderes derfor ikke at være behov for en supplerende behandling, hvor der er behandlet fra omkring 2-3 bladstadiet. Ved en meget tidlig bekämpelse (1 bladstadiet) er virkningstiden af en bladlusbekämpelse kortere.

Fra praksis er også meldt om fund af bladlus i marker, som ligger længere væk fra kysten, og som er sået senere. Derfor er der opfordret til, at man generelt undersøger markerne for bladlus og udfører en bekämpelse, hvis man har let ved at finde bladlus. Der findes ingen tærskel for bladlus i relation til havrerødsot, fordi et varierende antal bladlus bærer virussmitten.

Til bekämpelse af bladlus kan anvendes halv dosering af et godkendt pyrethroid, det vil sige 0,125 l/ha Fastac 50, 0,1 kg/ha Karate 2,5 WG, 0,06 l/ha Cyperb/IT Cypermethrin, 0,1 l/ha Mavrik eller 0,125 kg/ha Pirimor (Pirimor anvendes kun midt på dagen, hvor temperaturen er højere).

Temperaturkortene, registreringerne samt kommentarerne har tilsammen udgjort registreringsnettet for bladlus i efteråret 2007.

Konsulenterne har derudover registreret angreb af havrerødsot i den usprøjtede del af marken i foråret 2008, som beskrevet senere.

### 2.3 Klimamodel

I samarbejde med Århus Universitet, DJF og DMI blev etableret en side på PlantefInfo<sup>1</sup> med en klimamodel. DMI fremskaffede vejrdata til projektet, herunder interpolerede døgn temperaturer for hele Danmark i et net af 1x1 km. Til opbygning af dette temperaturkort anvender DMI en speciel interpolationsmodel, som tager hensyn til kystnærhed, hvilket er nødvendigt for at få repræsentative værdier i kystområder. Disse klimadata blev benyttet til at vise bladlus graddage ifølge en engelsk model. Antallet af graddage opsummeres ud fra fremspændingstidspunktet i den enkelte mark. Modellen antager, at 2. generation bladlus forekommer ved 340 graddage (basis 3° C). I England anbefales sprøjting på dette tidspunkt. Ud fra markens fremspændingstidspunkt blev udviklingen i graddage vist. Da modellen ikke er testet under danske forhold, er der i stedet løbende vist udviklingen i bladlus graddage i efteråret 2007 i forhold til "normalen", det vil sige efterårene 1961-90 + 0,7 °C. Århus Universitet, DJF har beregnet, at temperaturen i efterårene siden 1990 er steget med i gennemsnit 0,7 °C, hvorfor 0,7 °C er lagt til gennemsnitstemperaturen. Antallet af bladlus graddage i efteråret 2007 kunne derfor sammenlignes med "normalen" for at vurdere, om temperaturen var højere eller lavere end normalt. Høje temperaturer gavner bladlusene og dermed spredningen af havrerødsot.

<sup>1</sup> PlantefInfo er et webbaseret videns- og beslutningsstøttesystem, der udvikles og drives af AU-DJF og Dansk LandbrugsRådgivning i fællesskab. PlantefInfo kan tilgås som en integreret del af LandbrugsInfo.

Efteråret 2007 var, ifølge DMI, ikke væsentligt forskellig fra normalen, hvad angår temperatur. I september var temperaturen normal, og der var mere nedbør og sol end normalt. Oktober var køligere end normalt, men tør og solrig. November var lidt varmere end normalt. Vinteren (december-februar) var væsentlig varmere end normalt, med en middeltemperatur på hele  $4,1^{\circ}\text{C}$ , hvilket er  $3,6^{\circ}\text{C}$  over normalen for perioden 1961-1990.

Det forholdsvis normale efterår har betydet, at bladlusaktiviteten ikke har været stor de første måneder efter såning af vintersæden, dvs. september-oktober.

## 2.4 Informationer til landmænd

Informationerne om fund af bladlus blev videresendt af de lokale planteavlskonsulenter til slutbrugerne, landmændene. Til formidling blev benyttet forskellige informationskanaler, så som:

1. Nyhedsbreve, trykte
2. Nyhedsbreve pr. mail
3. SMS-beskeder
4. Markvandringer og møder
5. Artikler i foreningsblade og andre lokale blade
6. Markbesøg

Derudover har varslingerne også været vist i Landbrugsavisen. Den enkelte landmand vil afhængigt af de aktuelle abonnementer og aftaler med det lokale rådgivningscenter have modtaget information via en eller flere af ovennævnte kanaler.

Varslingssystemet består således af komponenterne beskrevet i afsnit 2.2 til 2.4.

### 3 Interviewundersøgelse hos landmænd

I perioden 28. april til og med 6. maj 2008 har Jysk Analyse A/S udført en interviewundersøgelse hos 102 landmænd fra områder med forøget sandsynlighed for havrerødsot (risikoområder) og 106 landmænd fra områder med lavere sandsynlighed for havrerødsot (ikke risikoområder). Det benyttede spørgeskema blev udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Risikoområder hhv. ikke risikoområder blev udpeget af Landscentret, på baggrund af angreb af havrerødsot i vækstsæsonen 2007 samt erfaringer fra tidligere år. Spørgeskema, kort over de udpegede områder, samt analyseresultatet, er vedlagt rapporten som bilag. Spørgsmålene har været rettet imod at kortlægge de informationskilder landmændene har haft til rådighed, hvordan informationerne er anvendt, samt hvor meget og hvordan der eventuelt er behandlet mod bladlus i efteråret.

#### 3.1 Tolkning af analyserapport

I undersøgelsen indgår kun landmænd, som har dyrket vintersæd. Tabel 3.1 angiver andelen af landmænd, der har modtaget information om bekæmpelse af bladlus i efteråret 2007. Det ses, at landmænd bosat i risikoområderne i højere grad har modtaget denne information, sammenlignet med landmændene i ikke risikoområderne. Dette er formentlig et udslag af den forøgede risiko samt en øget bevægenhed i disse egne af landet.

**Tabel 3.1. Andel af adspurgte landmænd der har modtaget information fordelt på hhv. risikoområde og ikke risikoområde.**

	Risiko-område (n=102)	Ikke risiko-område (n=106)
Har modtaget information	73%	54%
Har ikke modtaget information	27%	46%

De landmænd, der havde modtaget information om bekæmpelse af bladlus, blev endvidere spurgt, hvilken kilde til information de havde benyttet. Af tabel 3.2 fremgår det, at størstedelen af informationerne kommer fra landmandens konsulent og via fagpressen. Landmændene bosat i risikoområderne benytter i højere grad konsulenterne, sammenlignet med ikke risikoområderne. Derudover er der ikke stor forskel mellem de to grupper.

Det fremgår af tabel 3.3, at to ud af tre landmænd bosat i risikoområderne selv har kigget efter bladlus i efteråret. Derimod har kun hver anden landmand fra ikke risikoområderne kigget efter bladlus i efteråret 2007. At det er en god ide at kigge efter bladlus i risikoområderne fremgår af tabel 3.4, hvoraf det ses, at halvdelen af de landmænd, der har kigget efter bladlus, faktisk også har fundet bladlus. I ikke risikoområderne er det under hver 5. landmand, der har fundet bladlus. I tabel 3.5 er angivet andelen af landmænd, der har sprøjtet mod bladlus i efteråret. Der er en stor forskel på de to

områder, idet langt flere har sprøjtet i risikoområderne, i forhold til ikke risikoområderne. Dette giver god mening, eftersom risikoområderne var hårdt ramt af havrerødsot i sæsonen 2007, med kun halvt udbytte i de værst angrebne marker. Som det også fremgår af tabel 3.5, blev størstedelen af de landmænd, der modtog information i efteråret, anbefalet at sprøjte, såfremt de var bosat i risikoområderne. For ikke risikoområderne indeholdt en langt mindre del af de udsendte informationer anbefalinger om at sprøjte mod bladlus. Varslingerne har således virket efter hensigten, derved at anbefalingerne er kommet ud til de landmænd, der har haft behov for at bekæmpe bladlus.

**Tabel 3.2. Informationskilde for de landmænd der modtog information omhandlende bekæmpelse af bladlus i vintersæd i efteråret 2007. Kun landmænd, der dyrkede vintersæd, indgår i opgørelsen. (Flere svarmuligheder).**

	Ikke Risiko- område (n=74)	Risiko- område (n=57)
Konsulent fra landbocenter	62%	46%
Privat konsulent	5%	0%
Landbocentrets hjemmeside eller landmand.dk	7%	7%
Firma (grovvare eller kemikaliefirma)	9%	14%
Fagpresse	22%	23%
Nabo	1%	0%
Andet	19%	21%
Ved ikke/		
Vil ikke svare	11%	11%

**Tabel 3.3. Andel af landmænd der har kigget/ikke kigget efter bladlus i vintersæd i efteråret 2007.**

	Risiko- område (n=102)	Ikke risiko- område (n=106)
Har kigget efter bladlus	67%	48%
Har ikke kigget efter bladlus	33%	52%

**Tabel 3.4. Andel af landmænd der har fundet bladlus i vintersæd i efteråret 2007, forudsat at de har kigget.**

	Risiko- område (n=67)	Ikke risiko- område (n=51)	
Har fundet bladlus	50%	18%	
Har ikke fundet bladlus	50%	82%	

**Tabel 3.5. Andel af landmænd der hhv. har og ikke har sprøjtet mod bladlus i vintersæd i efteråret 2007, samt andelen af landmænd der via den modtagne information blev anbefalet at sprøjte.**

	Risiko- område (n=102)	Ikke risiko- område (n=106)		Risiko- område (n=74)	Ikke risiko- område (n=57)
Har sprøjtet	52%	12%	Blev anbefalet at sprøjte	69%	30%
Har ikke sprøjtet	48%	88%			

Der er færre, som har sprøjtet mod bladlus, end der aktuelt gennem varslingen er blevet anbefalet at sprøjte. Når landmanden skal træffe beslutning om at sprøjte, er der en lang række faktorer, der gør sig gældende. At færre har sprøjtet kan f.eks. skyldes, at landmændene ikke har fundet bladlus eller har sået vintersæden meget sent, og risikoen for angreb derfor har været relativt lille.

I undersøgelsen blev landmændene spurgt om årsagen til, at de havde valgt at sprøjte deres vinterbyg eller vinterhvede mod bladlus. Resultatet er angivet i tabel 3.6. Det fremgår heraf, at landmanden baserer sin beslutning på flere oplysninger. Som beskrevet, har en stor del af landmændene selv været ude at kigge efter bladlus, hvilket også i tabel 3.6 er angivet som en vigtig årsag til at sprøjte. Knap en tredjedel af de landmænd, der har valgt at sprøjte i risikoområderne, har angivet, at omkostningerne ved at sprøjte er små i forhold til risikoen ved et eventuelt angreb af havrerødsot. Især efter et år med meget angreb, som 2007, er der formentlig mange der har vurderet, at risikoen har været større end normalt. Som beskrevet i indledningen, blev der da også fundet mange bladlus mange steder. At landmændene derfor baserer sprøjtningen på egne observationer er særdeles positivt, især når disse observationer suppleres med anden form for varsling.

**Tabel 3.6. Årsager til at det blev besluttet at sprøjte mod lus i vintersæd i efteråret 2007. (Flere svarmuligheder).**

	Risiko- område (n=53)	Ikke risiko- område (n=13)
Fik vejledning fra konsulent	13%	8%
Omkostninger er små i forhold til risiko	32%	23%
Har vurderet, at der var et behov	21%	46%

Jeg fandt bladlus	53%	54%
Andet	21%	8%

For at vurdere nødvendigheden af et beslutningsstøttesystem for havrerødsot, blev de landmænd i de to områder, der havde sprøjtet i efteråret 2007 spurt, hvorydigt de tidligere havde sprøjtet mod bladlus om efteråret. Resultatet ses i tabel 3.7. Vær opmærksom på, at det kun er landmænd, der har sprøjtet, som har svaret på dette spørgsmål, og at andelen, der havde sprøjtet i ikke risiko områder, var langt mindre end i risikoområder. Det fremgår af tabellen, at to ud af tre landmænd i risikoområder aldrig havde sprøjtet før, hvor der er en mere jævn fordeling i ikke risikoområdet. Denne fordeling i risikoområder indikerer, at der i efteråret 2007 har været en eller flere faktorer, der har påvirket landmændene til i højere grad, at vælge at sprøjte. Fund af relativt mange bladlus i registreringsnettet og fokus på de store tab, som følge af havrerødsot i 2007, sammenholdt med omkostningerne til sprøjtning, har resulteret i flere sprøjtninger mod bladlus.

**Tabel 3.7. Opdeling af landmænd efter hvor ofte de i årene forud for 2007 har sprøjtet mod bladlus i vintersæd.**

	Ikke risiko-område (n=53)	Risiko-område (n=13)
Aldrig	66%	38%
Enkelte gange	25%	46%
Oftere end hvert 3. år	9%	15%

I kapitel 4 er konsulenternes bedømmelser af angreb af havrerødsot sammenstillet, så det er muligt at vurdere betydningen af bladlusangrebene i efteråret 2007.

### 3.2 Anvendelse af SMS-varsling

Dansk Landbrugsrådgivning har udviklet en SMS-service, der kan målrettes bedrifter med specifikke afgrøder, eksempelvis vinterbyg og vinterhvede. Det var derfor forventet, at om ikke alle, så dog et antal rådgivningscentre havde benyttet dette system til varsling for bladlus i efteråret.

Efter interviewundersøgelsen hos landmændene, blev det klart, at det kun var en begrænset del, der havde modtaget varslinger via SMS. Således var der ingen registreringer om SMS-varsler i risikoområdet, mens 9 % af de landmænd der havde modtaget information i ikke-risikoområdet havde modtaget den via SMS. Landscentret ringede efterfølgende rundt til en række rådgivningscentre lokaliseret i risikoområder for at få klarlagt, om systemet var blevet anvendt til varsling for bladlus. Der var ingen af de adspurgte centre, der havde anvendt systemet til at varsle for bladlus med den grundelse, at systemet kun anvendes til akutte informationer, og at de ikke har opfattet varslinger om bladlusflyvninger i efteråret som hørende til denne kategori. SMS-varslinger er typisk benyttes til at gøre opmærksom på, hvornår et givet 'problem' er aktuelt, men også hvornår det ikke længere er aktuelt at ofre 'problemets' opmærksomhed. En enkelt forening har valgt kun at bruge systemet til at informere landmanden om, hvornår der er nyheder tilgængeligt på deres hjemmeside, således at den enkelte landmand ikke får direkte information/råd i SMS'en, men alene en henvisning. Fremgangsmåden

medfører risiko for, at landmanden ikke drager fordel af varslingen og vejledningen som følge af, han ikke efterfølgende får kigget på hjemmesiden.

For at få viden om anvendeligheden af SMS-varslingssystemet, er 10 landmænd i det sydlige Danmark kontaktet af Landscentret i juni 2008. Fælles for disse landmænd er, at de alle er tilknyttet et rådgivningscenter, der meget aktivt anvender SMS som informationskilde. Ydermere blev kun landmænd tilknyttet SMS-ordningen udvalgt. Der blev således ikke taget hensyn til, om foreningen havde varslet for angreb af bladlus i efteråret eller ej, men blot at SMS-systemet bliver benyttet til varsling.

Den generelle holdning blandt de kontaktede landmænd har været, at SMS er en rigtig god form for formidling fra konsulenterne. Den største fordel ved systemet er, at de altid får informationen, når den er relevant, og ikke selv skal ind og tænde for computeren og f.eks. læse en e-mail. Der er også generel enighed om, at systemet er nemt at håndtere, og der var sågar enkelte der syntes, at der kom for lidt information via SMS. Det kunne tyde på, at konsulenternes nævnte tilbageholdenhed med at anvende systemet til mere end akutte beskeder, har været overdreven.

Landmændene bruger SMS'erne som beslutningsstøtte til f.eks. at udføre sprøjtning. En enkelt landmand sagde, at han som regel havde sprøjtningerne i tankerne, men at SMS'en var et godt redskab til at hjælpe ham med at træffe den endelige beslutning.

Det er meget vigtigt for landmændene, at den SMS de modtager, er relevant og rettidig. De landmænd, der ikke fandt systemet brugbart, havde næsten alle behandlet inden de fik SMS'en vedrørende det aktuelle problem. At få leveret SMS'erne rettidigt stiller selvfølgelig krav til konsulenten, og der er da heller ikke nogen tvivl om, at det er utrolig vigtigt, at konsulenten bruger den nødvendige tid til at formulere SMS'en kort og præcist. Der er 150 tegn til rådighed i en SMS, og det er ikke ret meget til at få belyst alle aspekter af eksempelvis risikoen for angreb af havrerødsot.

En enkelt landmand påpegede, at klimabetingelserne inden for rådgivningscentrets område, efter hans mening, varierede forholdsvis meget, hvorfor en for området fælles informationen ikke altid var relevant for ham.

## 4 Bedømmelser af angreb af havrerødsot

Konsulenterne, som i efteråret 2007 indberettede fund af bladlus til registreringsnettet, har i maj måned bedømt angreb af havrerødsot samt givet oplysninger om forbruget af skadedyrsmidler i de pågældende marker. Den 29. april fik konsulenterne tilsendt et spørgeskema til indberetning af bedømmelserne. En oversigt over de indkomne svar er vedlagt som bilag til denne rapport. Spørgsmålene omhandlede angrebsgraden af havrerødsot samt oplysninger om sprøjtetidspunkt, middelvalg og dosering i den evt. sprøjtede del af marken.

Bedømmelsen af angreb af havrerødsot i maj er foretaget i den ubehandlede del af marken. Ved bedømmelsen er der visuelt vurderet procent angrebne planter ved at gå i w-form eller diagonalt over marken. Angrebene er angivet i intervaller, det vil sige 0, 1-5, 6-10 procent angrebne planter osv. Såfremt landmanden i efteråret ønskede at behandle sit areal, blev der truffet aftale om at efterlade en usprøjtet del af mærken til bedømmelse (minimum 3 sprøjtespor). Denne del blev af konsulenten markeret med hvide flexstokke. Ved bedømmelse i behandlede marker, blev der både bedømt i den sprøjtede og den usprøjtede del. Samtidig blev antallet af sprøjtninger, anvendt dosis, middel og sprøjtetidspunkt noteret. Der blev i efteråret indberettet for 40 vinterhvedemarker og 20 vinterbygmarker. Der er imidlertid 3 vinterbyg- og 7 vinterhvedemarker, der ikke indgik i registreringen i foråret, fordi der ikke blev efterladt et usprøjtet område. Datasættet består herefter af 17 vinterbygmarker og 33 vinterhvedemarker.



**Foto 1.** Angreb af havrerødsot i vinterhvede. Smitten sker via bladlus om efteråret, men symptomerne ses først fra foråret. Angrebene viser sig pletvis i marken. Angrebne planter er kortere, der er færre og kortere aks, og kernerne bliver skrumpne, fordi planterne nødmodner.



**Foto 2.** Røde bladspidser i vinterhvede er et sikkert tegn på angreb af havrerødsot.



**Foto 3.** Angreb af havrerødsot i vinterbyg viser sig også pletvis i marken, men angreb i vinterbyg leder ofte til udvintring, hvorfor tabene i vinterbyg i angrebne pletter oftest er 100 procent.

#### 4.1 Tolkning af data vedrørende af havrerødsot

I tabel 4.1. er vist resultatet af konsulenternes registreringer af havrerødsot i vinterhvede. Data er inddelt efter såtidspunkt, og det ses, at der overvejende har været svage angreb af havrerødsot. Ved angreb i intervallet f.eks. 1-5 procent angrebne planter er valgt 2,5 procent angrebne planter. Af tabellen ses det dog også, at variationen er stor, idet der i en enkelt hvedemark er fundet op til 35 % angrebne planter. Flere forsøg viser, at når vinterhvede angribes af havrerødsot, går omkring halvdelen af udbyttet tabt i de angrebne pletter (se Planteavlsorientering 09-831 og Huth 1990). Skadetærsklen i vinterhvede ligger på ca. 2 % angrebne planter, såfremt udbyttetabet i de angrebne planter er 50 procent. Med et sådant angreb vil tabet i udbytte modsvare omkostningerne ved behandling og udbringning i efteråret. Ofte kan bekæmpelsen kombineres med ukrudtsbekæmpelsen, og tærsklen er så 1 procent angrebne planter, idet der ikke skal "betales" for udbringning af midlet. I alt 24 procent af hvedemarkerne havde angreb over tærsklen på 2 procent.

Grundet relativt svage angreb ses ingen tydelig effekt af sådato. Ifølge konsulenterne har mange landmænd med kraftige angreb i vinteren 2006/2007 tilstræbt at udsætte såningen i efteråret 2007.

Grunden til de forholdsvis svage angreb skal formentlig findes i klimabetingelserne først på efteråret 2007. Som beskrevet, adskilte efteråret sig ikke væsentligt fra et "normalt" år, hvilket har betydet en begrænset bladlusaktivitet. Til gengæld var temperaturen hen over vinteren meget høj, hvilket resulterede i en lang periode med gode betingelser for spredning af smitte. I marker uden for registreringsnettet er der også meldt om tilfælde af kraftige angreb i 2008, men ikke tilnærmelsesvis i samme omfang som i 2007.

**Tabel 4.1. Konsulenternes registreringer af angreb af havrerødsot i vinterhvede i foråret 2008 og det gennemsnitlige angreb af bladlus i efteråret 2007. n = antal marker.**

Såtidspunkt	Gennemsnitlig % planter med havrerødsot, usprøjtet	Andel sprøjtet	Gennemsnitlig % planter med bladlus i efteråret 2007, usprøjtet	Max. angreb (% planter med havrerødsot, usprøjtet)
Før 5. september (n=2)	0	50%	0,7	0
6-10. september (n=8)	0,6	63%	4,6	2,5
11-20. september (n=22)	2,8	73%	2,0	35,0
21-30. september (n=1)	2,5	100%	1,9	2,5

I winterbyg har der ligeledes været overvejende svage angreb af havrerødsot i foråret (tabel 4.2.). Skadetærsklen i winterbyg er 1 % angrebne planter, idet forsøg har vist, at angreb i winterbyg resulterer i 100 % udbyttetab. En stor del af de undersøgte marker har været over tærsklen (overskredet i 41 procent af markerne), og sprøjtning i efteråret burde være foretaget. Af tabellen ses det da også, at størstedelen af de tidligt såede marker blev sprøjtet, men for de senere såede er under halvdelen sprøjtet. Denne fordeling er ikke overraskende, idet talrige forsøg viser, at jo tidligere der sås, jo sterkere angreb må forventes i foråret, og dermed vælger mange landmænd at bekæmpe bladlus i de tidligst såede marker. Såtiden kan dog ikke udsættes ubegrænset, da sen såning er forbundet med udbyttetab. For ejendomme, hvor der skal sås store arealer, er det risikabelt at udsætte såningen.

**Tabel 4.2. Konsulenternes registreringer af angreb af havrerødsot i vinterbyg i foråret 2008 og det gennemsnitlige angreb af bladlus i efteråret 2007. n= antal marker**

Sætidspunkt	Gennemsnitlig % planter med havrerødsot, usprøjtet	Andel sprøjtet	Gennemsnitlig % planter med bladlus i efteråret 2007, usprøjtet	Max. angreb (% planter med havrerødsot, usprøjtet)
6-10. september (n=7)	0,7	71%	3,5	2,5
11-20. september (n=10)	1,8	40%	6,6	7,5

I tabel 4.3. er angivet den anvendte dosis, hvor der er sprøjtet. Det ses, at størstedelen af behandlingerne er foretaget med reduceret dosis. Hvor bekämpelse er foretaget, er der i de fleste tilfælde ikke efterfølgende fundet angreb af havrerødsot i foråret. I marken med det kraftigste angreb er angrebet reduceret fra 21-50 til 11-20 procent angrebne planter.

**Tabel 4.3. Dosis anvendt til bekämpelse af bladlus i efteråret 2007 i procent af fuld dosering.**

Dosis hvis sprøjtet:	Vinterhvede (n=23)	Vinterbyg (n=9)
Fuld dosis	13%	33%
Halv dosis	70%	56%
Kvart dosis	17%	11%

Når der sprøjtes mod bladlus, foretrækker landmanden at gøre det på 3-4 bladstadiet, der er det tidspunkt, hvor der forventes maksimal effekt af bekämpelsen. Der er kun en enkelt landmand, der i efteråret 2007 har sprøjtet mere end en gang.

## 5 Perspektivering

De ændrede klimaforandringer vil medføre større aktivitet af bladlus om efteråret, og dermed kraftigere angreb af havrerødsot. Udfordringen i fremtiden bliver derfor at få udviklet værkøjer, der er i stand til at forsyne landmanden med rettidige varslinger og beslutningsstøtte, således at pesticidforbruget til bekæmpelse af bladlus kan holdes på et minimum.

De vigtigste faktorer i en varsling er forekomsten af a) bladlus, b) klimaforholdene i efteråret og vinterens løb og c) såtidspunktet. Bedømmelser af bladlus i registreringsnettet giver overordnet et indtryk af angrebsstyrken. Bladlusene kan godt være svære at finde i marken, da de optræder enkeltvis og ikke i kolonier som om sommeren. Da en varierende andel af bladlusene indeholder smitten, vil der ikke være en lineær sammenhæng mellem angreb af bladlus i efteråret og procent planter angrebet af havrerødsot.

Klimaforholdene i efteråret og vinteren har stor betydning for, hvor længe bladlusene kan overføre havrerødsotvirus samt for bladlusenes aktivitet.

Forekommer der mange bladlus, vil bekæmpelse blive tilrådet, da klimaforholdene resten af efteråret og vinteren først kendes senere. Med de nuværende prisforhold vil skadetærsklen være i størrelsesordenen 1-2 procent angrebne planter. Dette medfører, at landmænd i risikoområder har brug for et relativt sikkert beslutningsstøttesystem, før de kan undlade bekæmpelse. En udsættelse af såtiden kan mindske risikoen for angreb, men den kan ikke udsættes ubegrænset, da for sen såning er forbundet med udbyttetab. Især når der skal tilsås store arealer, er det risikabelt at udsætte såningen, idet ugunstige vejrforhold efterfølgende kan forhindre, at afgrøden bliver etableret. Der er derfor behov for at videreforske varslingssystemet for bladlus om efteråret og forskning i en bedre forståelse af bladlusenes biologi i relation til angreb af havrerødsot.

Beslutningsstøtte kan bestå af en række informationstjenester, der på forskellig måde formidler den nødvendige viden til landmanden til rette tid. Det må forventes, at informationsteknologien giver nye muligheder for at målrette informationen.

Der er et spændende potentiale i udsendelse af korte rettidige og målrettede SMS'er. Efterhånden som rådgivningscentrene vokser sig større, må de udsende områdevisse SMS'er. Det er allerede muligt at sortere efter postnummer og på den måde få gjort rådgivningen endnu mere lokal og målrettet, end den er i dag. Endvidere kunne systemet rationaliseres mere, end det er i dag, f.eks. ved at Landscentret udsender differentierede varslinger til konsulenterne, som de efterfølgende vil kunne sende til de respektive dele af deres dækningsområder.

Projektet bekræfter, at vurdering af bekæmpelsesbehov og beslutning om bekæmpelse af en skadevolder er en kompleks proces, der som oftest bygger på informationer fra flere kilder, egne erfaringer og observationer. Ved udvikling og etablering af varslinger, er det derfor vigtigt at inddrage både formidler og modtager i udviklingen.

I principippet kan varslinger for bekæmpelse af skadevoldere udsendes af hvem som helst, herunder de firmaer, der sælger plantebeskyttelsesmidler og forskningsinstitutioner, men da det altid vil være nødvendigt med en vis grad af eksperiskøn, er det afgørende, at de personer, der skal foretage disse skøn ikke har økonomisk eller karrieremæssig interesse i udfaldet af varslingen, og at de er nært relateret til praksis, praksisnære forsøg og kender landmændenes beslutningsadfærd.

Projektet har fokuseret på havrerødsot. Hvis beslutningsstøtte fortsat skal medvirke til at reducere pesticidforbruget mest muligt, er der løbende behov for at konsolidere og videreudvikle systemer for en række skadevoldere gennem forskning, IT-udvikling, praksisnære forsøg og udvikling af rådgivningen. Aktuelt kan varsling for knoldbægersvamp i vinterraps, hvedegalmyg i vinterhvede og bladlus i vintersæd om efteråret nævnes som emner for yderligere forskning og udvikling af beslutningsstøtte. På grund af ændringer af klima, dyrkningsteknik, sorter mv., kan det forudsies, at der løbende bliver behov for en indsats.

Hvis ikke der forskes og udvikles tilstrækkeligt, er der risiko for, at det danske forbrug af pesticider langsomt vil stige og nærme sig det væsentligt større forbrug, der kendtegner landbruget i vore nabolande, hvor det for fleres vedkommende er væsentligt større end i Danmark.

## 6 Litteraturliste

- Hüth, W: Barley yellow dwarf – ein permanentes problem für den Getreidebau in der Bundesrepublik Deutschlands ? Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., 42, 1990.
- Planteavlsorientering nr.09-831: Udbyttetab ved angreb af havrerødsot i hvede. 26. September 2007.



## 1 Kort over udpegede områder

Nedenstående kort viser oversigt over henholdsvis risiko- og ikke risikoområder, udpeget af Landscentret til interviewundersøgelse i maj måned 2008.





# 1 Spørgeskema brugt til interviewundersøgelse

I det følgende er listet de spørgsmål, landmændene blev stillet af Jysk Analyse, i forbindelse med projektet.

**1) Dyrker du vinterbyg eller hvede i år?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

Hvis der svarer nej, indgår landmanden ikke i undersøgelsen.

**2) Hvilket postnummer har du?**

---

**3) Hvad er din hovedproduktion?**

- (1)  Planteavl
- (2)  Kvægbrug
- (3)  Svineproduktion
- (4)  Andet (fjerkræ, mink, grønsager o.lign.)

**4) Hvad er din alder?**

- (1)  Under 29
- (2)  30-39
- (3)  40-49
- (4)  50-59
- (5)  60 og derover

**5) Ved du, at bladlus i vintersæden om efteråret kan overføre viruset havrerødsot?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**6) Har du i efteråret 2007 modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus?**

- (1)  Ja

(2)  Nej

**7) Hvis ja til ovennævnte spørgsmål 6: Fra hvem har du modtaget informationen om at sprøjte mod bladlus (der må gerne angives flere svar)?**

- (1)  Konsulent fra landbocenter
- (1b)  Privat konsulent
- (1c)  Landbocentrets hjemmeside eller landmand.dk
- (2)  Firma (grovvare- eller kemikaliefirma)
- (3)  Fagpresse
- (4)  Nabo
- (5)  Andet Angiv: \_\_\_\_\_

**8) Hvis ja til spørgsmål 6: På hvilken form er informationerne i givet fald modtaget (der må gerne angives flere svar)?**

- (1)  Nyhedsbreve
- (2)  SMS
- (3)  Markbesøg
- (4)  Fagpresse
- (5)  Telefonisk
- (6)  Reklamer
- (7)  Internet
- (8)  Andet Angiv: \_\_\_\_\_

**9) Hvis ja til spørgsmål 6: Blev sprøjtning mod bladlus anbefalet?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**10) Har du kigget efter bladlus i dine vintersædsmarker i efteråret 2007?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**11) Hvis ja i spørgsmål 10: Har du fundet bladlus i nogle af dine vintersædsmarker i efteråret 2007?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**12) Har du sprøjtet mod bladlus i nogle af dine vintersædsmarker i efteråret 2007?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**13) Hvis ja til spørgsmål 12: Hvorfor har du sprøjtet? (der må gerne angives flere svar)**

- (1)  Fik vejledning fra konsulent
- (2)  Omkostninger er små i forhold til risiko
- (3)  Har vurderet, at der var et behov
- (4)  Jeg fandt bladlus
- (5)  Andet Angiv: \_\_\_\_\_

**14) Hvis ja til spørgsmål 12: Har den højere kornpris haft betydning for din beslutning om at sprøjte?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**15) Hvis ja til spørgsmål 12: I hvor mange procent af dine vinterbygmarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?**

- (1)  En fjerdedel
- (2)  En fjerdedel til halvdelen
- (3)  Halvdelen til næsten alle
- (4)  Alle

**16) Hvis ja til spørgsmål 12: Hvor mange af dine vinterhvedemarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?**

- (1)  En fjerdedel
- (2)  En fjerdedel til halvdelen
- (3)  Halvdelen til næsten alle
- (4)  Alle

**17) Hvis ja til spørgsmål 12: Hvor mange gange har du typisk sprøjtet mod bladlus i vinterbyg i efteråret 2007?**

- (2)  Under 1 gang
- (1)  1 gang
- (3)  2 gange
- (4)  3 gange

**18) Hvis ja til spørgsmål 12: Hvor mange gange har du typisk sprøjtet mod bladlus i vinterhvede i efteråret 2007?**

- (2)  Under 1 gang
- (1)  1 gang
- (3)  2 gange
- (4)  3 gange

**19) Hvis ja til spørgsmål 12: Hvilken dosis har du typisk brugt mod bladlus i efteråret 2007?**

- (1)  Fuld dosis
- (2)  Halv dosis
- (3)  Kvart dosis
- (4)  Ved ikke

**20) Hvis ja til spørgsmål 12: Vil du også sprøjte mod bladlus i det kommende efterår?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej
- (3)  Kun ved behov
- (4)  Ved ikke

**21) Hvis ja til spørgsmål 12: Har du også i tidligere år sprøjtet mod bladlus om efteråret?**

- (1)  Aldrig
- (2)  Enkelte gange
- (3)  Oftere end hvert 3. år

**22) Har du oplevet at have havrerødsot i dine vintersædsmarker?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej
- (3)  Ved ikke

**23) Har dine naboer haft havrerødsot i deres vintersædsmarker?**

- (1)  Ja
- (2)  Nej
- (3)  Ved ikke

**24) Evt. supplerende kommentarer:**

---

---

---

---



# 1 Resultater af interviewundersøgelse, landmænd

Resultaterne af landmændenes svar på interviewundersøgelsen er listet nedenfor. Resultaterne er opdelt efter risiko- eller ikke risikoområde og vist på tabelform.

## 1.1 Resultater fra ikke risikoområdet

Materialets sammensætning		
Deltagelse:	%	Antal uvejet
Respondenten vil deltagte	88%	194
Respondenten ønsker ikke at deltagte	12%	26
Total	100%	220

Materialets sammensætning		
Dyrkning af vinterafgrøder:	%	Antal uvejet
Dyrker vinterafgrøder	55%	106

Dyrker ikke --> afslut interview	45%	88
Total	100%	194

Materialets sammensætning

Alder:

	%	Antal uvejet
Til og med 39 år	24%	25
40 - 49 år	45%	48
50 år +	31%	33
Total	100%	106

Materialets sammensætning

Køn:

	%	Antal uvejet
Mand	98%	104
Kvinde	2%	2
Total	100%	106

**Spørgsmål 2: Hvad er din hovedproduktion?**

Vandret %-beregning	Planteavl	Kvægbrug	Svine- produktion	Andet (fjerkæ, mink, grønsager o.lign.)	Antal
	%	%	%	%	
Til og med 39 år	16%	28%	56%		25
Alder:					
40 - 49 år	21%	19%	50%	10%	48
50 år +	39%	21%	36%	3%	33
Køn:					
Mand	25%	22%	47%	6%	104
Kvinde	50%		50%		2
Total	25%	22%	47%	6%	106

**Spørgsmål 3: Ved du, at bladlus i vintersæden om efteråret kan overføre viruset havrerødsot?**

Vandret %-beregning	Ja	Nej	
	%	%	Antal
Planteavl	93%	7%	27
Kvægbrug	39%	61%	23
Hoved- produktion:			
Svineproduktion	84%	16%	50
Andet	67%	33%	6
Til og med 39 år	68%	32%	25
Alder:			
40 - 49 år	79%	21%	48
50 år +	76%	24%	33
Køn:			
Mand	75%	25%	104

Total	Kvinde	100%	2
		75%	25%
		106	

**Spørgsmål 4: Har du i efteråret 2007 modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	%	Antal
Panteavl	63%	37%	27	
Kvægbrug	30%	70%	23	
Svineproduktion	60%	40%	50	
Andet	50%	50%	6	
Til og med 39 år	48%	52%	25	
40 - 49 år	52%	48%	48	
50 år +	61%	39%	33	
Mænd	53%	47%	104	
Kvinde	100%		2	
Total	54%	46%	106	

**Spørgsmål 5: Fra hvem har du modtaget informationen om at sprøjte mod bladlus?**

Flere svarmuligheder	Konsulent fra landbocenter	Privat konsulent	Landbocentrets hjemmeside eller landmand dk	Firma (grossøvere- eller kemikaliefirma)	Fagpresse	Nabo	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
----------------------	----------------------------	------------------	---	--	-----------	------	---------------	-------------------------	-------

	Planteavl	53%	6%	24%	24%	18%	17
	Kvægbrug	29%		29%		14%	14%
Hovedproduktion:	Svineproduktion	47%	10%	17%	20%	17%	7%
	Andet	33%		33%	33%	67%	30
Alder:	Til og med 39 år	33%		25%	33%	25%	8%
	40 - 49 år	44%	4%	16%	12%	20%	16%
	50 år +	55%	15%	5%	30%	20%	5%
Køn:	Mand	45%	7%	13%	24%	22%	11%
	Kvinde	50%		50%			55
Total		46%	7%	14%	23%	21%	57

Betingelse: Har modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

**Spørgsmål 6: På hvilken form er informationerne i givet fald modtaget?**

Fleste svaremuligheder	Nyhedsbreve	SMS	Markedsøg	Fagpresse	Telefonisk	Reklamer	Internet	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
Hovedproduktion:	Planteavl	65%	29%	12%	24%		6%	18%	6%	17
	Kvægbrug	14%	14%	29%	43%		14%	14%		7
	Svineproduktion	50%	13%	23%	13%	7%	13%	13%	17%	30
	Andet	67%				33%	33%			3
Alder:	Til og med 39 år	67%	8%	33%	33%		8%	8%	17%	12

<b>40 - 49 år</b>	36%	8%	24%	16%	12%	20%	4%	20%		25
<b>50 år +</b>	60%	10%	20%	5%	20%			10%	5%	20
<b>Køn:</b>										
<b>Mand</b>	51%	9%	24%	15%	11%	9%	11%	16%	2%	55
<b>Kvinde</b>	50%		50%	50%	50%	50%				2
<b>Total</b>	51%	9%	25%	16%	12%	11%	11%	16%	2%	57

Betingelse: Har modtaget information om behov for at sprejte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

**Spørgsmål 7: Blev sprejtning mod bladlus anbefalet?**

Vandret %-beretning	Ja		Nej		Antal
	%	%	%	%	
<b>Hoved- produktion:</b>					
Planteavl	41%	59%	17		
Kvægbrug	29%	71%	7		
Svineproduktion	20%	80%	30		
Andet	67%	33%	3		
<b>Alder:</b>					
Til og med 39 år	33%	67%	12		
40 - 49 år	28%	72%	25		
50 år +	30%	70%	20		
<b>Køn:</b>					
Mand	29%	71%	55		
Kvinde	50%	50%	2		
<b>Total</b>	30%	70%	57		

Betingelse: Hår modtaget information om behov for at sprejte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

**Spørgsmål 8: Har du kigget efter bladlus i dine vintersædmarker i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	Antal	
Hoved- produktion:	Planteavl	63%	37%	27
	Kvægbrug	35%	65%	23
	Svineproduktion	46%	54%	50
	Andet	50%	50%	6
Alder:	Til og med 39 år	44%	56%	25
	40 - 49 år	48%	52%	48
	50 år +	52%	48%	33
Køn:	Mand	47%	53%	104
	Kvinde	100%		2
Total		48%	52%	106

**Spørgsmål 9: Har du fundet bladlus i nogle af dine vintersædmarker i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	Antal	
Hoved- produktion:	Planteavl	18%	82%	17
	Kvægbrug	13%	88%	8
	Svineproduktion	22%	78%	23

	<b>Andet</b>		100%	3
Alder:	Til og med 39 år	36%	64%	11
	40 - 49 år	9%	91%	23
	50 år +	18%	82%	17
Køn:	Mand	18%	82%	49
	Kvinde		100%	2
Total		18%	82%	51

Betingelse: Har kigget efter bladlus i vintersædsmarker i efteråret 2007. Jvf. spørgsmål 8

Vandret %-beretning	<b>Ja</b>		<b>Nej</b>	
	%	%	%	Antal
Planteavl	15%	85%		27
Kvægbrug	9%	91%		23
Svineproduktion	12%	88%		50
Andet	17%	83%		6
Alder:	Til og med 39 år	20%	80%	25
	40 - 49 år	8%	92%	48
	50 år +	12%	88%	33
Køn:	Mand	13%	88%	104
	Kvinde		100%	2

Total	12%	88%	106
-------	-----	-----	-----

**Spørgsmål 13: Hvorfor har du sprøjtet?**

Flere svarmuligheder	Flk vejledning fra konsulent	Omkostringer er små i forhold til risiko	Har vurderet, at der var et behov	Jeg fandt bladlus	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	25%	25%	75%			4
	Kvægbrug	50%	100%	50%			2
	Svineproduktion	17%	33%	50%	17%		6
	Andet	100%	100%				1
Alder:	Til og med 39 år	20%	60%	60%			5
	40 - 49 år	25%	50%	25%	25%		4
	50 år +	25%	25%	75%			4
Køn:	Mand	8%	23%	46%	54%	8%	13
Total		8%	23%	46%	54%	8%	13

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersedsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 14: Har den højere kompris haft betydning for din beslutning om at sprejte?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	Antal	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	50%	50%	4

	<b>Kvægbrug</b>	100%		2
	<b>Svineproduktion</b>	17%	83%	6
	<b>Andet</b>	100%		1
	<b>Til og med 39 år</b>	60%	40%	5
<b>Alder:</b>	<b>40 - 49 år</b>	50%	50%	4
	<b>50 år +</b>	25%	75%	4
<b>Køn:</b>	<b>Mand</b>	46%	54%	13
	<b>Total</b>	46%	54%	13

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 15: I hvor mange procent af dine vinterbygmarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Alle			Antal
	%	Har ikke vinterbyg- marker	Ved ikke/vil ikke svare	
<b>Planteavl</b>	25%	75%		4
<b>Kvægbrug</b>		100%		2
<b>Hoved- produktion:</b>				
<b>Svineproduktion</b>	83%		17%	6
<b>Andet</b>		100%		1
<b>Til og med 39 år</b>	60%	40%		5
<b>Alder:</b>	<b>40 - 49 år</b>	50%	50%	4
	<b>50 år +</b>	25%	50%	4
<b>Køn:</b>	<b>Mand</b>	46%	46%	13

Total	46%	46%	8%	13
Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.				

**Spørgsmål 16: Hvor mange gange har du typisk sprøjtet mod bladlus i vinterbyg i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Planteavl	Under 1 gang		Antal
		%	%	
Hoved- produktion:	Svineproduktion	17%	83%	1
Alder:	Til og med 39 år		100%	3
	40 - 49 år		100%	2
	50 år +	50%	50%	2
Køn:	Mand	14%	86%	7
Total		14%	86%	7

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vinterbygmarker. Jvf. spørgsmål 15.

**Spørgsmål 17: I hvor mange procent af dine vinterhvedemarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	En fjerde del	En fjerde del til halvdelen	Halvdelen til næsten alle		Alle	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
			%	%			
Hoved- produktion:	Planteavl		25%	50%	25%	4	4
	Kvægbrug			100%			2
	Svineproduktion	17%			67%	17%	6

	<b>Andet</b>				100%		
	Til og med 39 år			40%	60%		
Alder:	<b>40 - 49 år</b>				75%	25%	
	50 år +	25%	25%	50%			4
Køn:	<b>Mand</b>	8%	8%	31%	46%	8%	
Total		8%	8%	31%	46%	8%	13

Betingelse: Har sprøjted mod blædlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 18: Hvor mange gange har du typisk sprøjted mod blædlus i vinterhvede i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Under 1 gang		1 gang		Antal
	%	%	%	%	
Planteavl			100%	4	
Kvægbrug			100%	2	
Hoved- produktion:					
Svineproduktion	17%	83%	6		
Andet		100%	1		
Til og med 39 år		100%	5		
Alder:					
40 - 49 år	25%	75%	4		
50 år +		100%	4		
Køn:					
Mand	8%	92%	13		
Total	8%	92%	13		

Betingelse: Hør sprøjted mod blædlus i vinterhvedemarker. Jvf. spørgsmål 17.

**Spørgsmål 19: Hvilken dosis har du typisk brugt mod bladlus i efteråret 2007?**

Vandret %-beretning	Fuld dosis	Halv dosis	Kvart dosis	Ved ikke/vil ikke svara	
	%	%	%	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	50%	25%		4
	Kvægbrug		50%	50%	2
	Svineproduktion	17%	17%	33%	6
Alder:	Andet		100%		1
	Til og med 39 år		20%	40%	5
	40 - 49 år		75%	25%	4
Ken:	50 år +	75%	25%		4
	Mænd	23%	15%	38%	13
Total		23%	15%	38%	13

Betingelse: Har sprojtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 20: Vil du også sprøjte mod bladlus i det kommende efterår?**

Vandret %-beretning	Ja	Kun ved behov	Ved ikke	
	%	%	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	25%	75%	4
	Kvægbrug	50%	50%	2
	Svineproduktion	17%	83%	6

	<b>Andet</b>		100%		1
	<b>Til og med 39 år</b>	40%	40%	20%	5
<b>Alder:</b>	<b>40 - 49 år</b>		100%		4
	<b>50 år +</b>	25%	75%		4
<b>Køn:</b>	<b>Mand</b>	23%	69%	8%	13
<b>Total</b>		23%	69%	8%	13

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 21: Har du også i tidligere år sprøjtet mod bladlus om efteråret?**

Vandret %-beretning	Aldrig			Antal
	%	%	%	
<b>Hoved- produktion:</b>				
<b>Planteavl</b>	75%		25%	4
<b>Kvægbrug</b>		50%	50%	2
<b>Svineproduktion</b>	33%	67%		6
<b>Andet</b>		100%		1
<b>Til og med 39 år</b>	20%	60%	20%	5
<b>Alder:</b>				
<b>40 - 49 år</b>	50%	50%		4
<b>50 år +</b>	50%	25%	25%	4
<b>Køn:</b>	<b>Mand</b>	38%	46%	15%
<b>Total</b>		38%	46%	15%

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 22: Har du oplevet at have havrerødsot i dine vintersædsmarker?**

Vandret %-beregning	Ja			Nej			Ved ikke		
	%	%	%	%	%	%	Antal		
Hoved- produktion:									
Planteavl	11%	89%					27		
Kvægbrug	17%	83%					23		
Svineproduktion	30%	68%	2%	50					
Andet		100%					6		
Alder:									
Til og med 39 år	28%	72%					25		
40 - 49 år	23%	75%	2%	48					
50 år +	12%	88%					33		
Køn:									
Mand		21%	78%	1%	104				
Kvinde			100%		2				
Total		21%	78%	1%	106				

**Spørgsmål 23: Har dine naboer haft havrerødsot i deres vintersædsmarker?**

Vandret %-beregning	Ja			Nej			Ved ikke		
	%	%	%	%	%	%	Antal		
Hoved- produktion:									
Planteavl	11%	48%	41%	27					
Kvægbrug	17%	26%	57%	23					
Svineproduktion	28%	32%	40%	50					

	<b>Andet</b>	17%	50%	33%	6
	<b>Til og med 39 år</b>	24%	32%	44%	25
<b>Alder:</b>	<b>40 - 49 år</b>	25%	35%	40%	48
	<b>50 år +</b>	12%	39%	48%	33
	<b>Mand</b>	21%	37%	42%	104
<b>Køn:</b>	<b>Kvinde</b>		100%	2	
	<b>Total</b>	21%	36%	43%	106

## 1.2 Resultater fra risikoområdet

### Materialets sammensætning

#### Deltagelse:

	%	Antal uvejet
<b>Respondenten vil deltagte</b>	82%	117
<b>Respondenten ønsker ikke at deltake</b>	18%	25
<b>Total</b>	100%	142

### Materialets sammensætning

#### Dyrkning af vinterafgrøder:

	%	Antal uvejet

Dyrker vintergrøder	87%	102
Dyrker ikke --> afslut interview	13%	15
Total	100%	117

#### Materialets sammensætning

Alder:

	%	Antal uvejet
Til og med 39 år	26%	27
40 - 49 år	36%	37
50 år +	37%	38
Total	100%	102

#### Materialets sammensætning

Køn:

	%	Antal uvejet
Mand	99%	101
Kvinde	1%	1
Total	100%	102

**Spørgsmål 2: Hvad er din hovedproduktion?**

Vandret %-beregning	Planteavl	Kvægbrug	Svineproduktion	Andet (fjekræ, mink, grønsager o.lign.)	Antal
Til og med 39 år	48%	15%	33%	4%	27
Alder: 40 - 49 år	46%	14%	41%		37
50 år +	71%	8%	18%	3%	38
Mand	55%	12%	31%	2%	101
Køn: Kvinder	100%				1
Total	56%	12%	30%	2%	102

**Spørgsmål 3: Ved du, at bladlus i vintersæden om efteråret kan overføre viruset havrevødsot?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	%	Antal
Planteavl	96%	4%	57	
Kvægbrug	92%	8%	12	
Hoved- produktion:				
Svineproduktion	94%	6%	31	
Andet	50%	50%	2	
Alder:				
Til og med 39 år	89%	11%	27	
40 - 49 år	100%		37	
50 år +	92%	8%	38	
Køn:				
Mand	94%	6%	101	

Total	Kvinde	100%		1
		94%	6%	102

**Spørgsmål 4:** Har du i efteråret 2007 modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus?

Vandret %-beretning	Ja		Nej	
	%	%	Antal	
Hoved- produktion:				
Planteavl	77%	23%	57	
Kvægbrug	58%	42%	12	
Svineproduktion	71%	29%	31	
Andet	50%	50%	2	
Alder:				
Til og med 39 år	78%	22%	27	
40 - 49 år	73%	27%	37	
50 år +	68%	32%	38	
Kør:				
Mand	72%	28%	101	
Kvinde	100%		1	
Total	73%	27%	102	

**Spørgsmål 5:** Fra hvem har du modtaget informationen om at sprøjte mod bladlus?

Flere svarmuligheder	Konsulent fra landbocenter	Privat konsulent	Landbocentrets hjemmeside eller landmand.dk	Firma (grossvare- eller kemikaliefirma)	Fagpresse	Nabo	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
----------------------	----------------------------	------------------	---	---	-----------	------	---------------	-------------------------	-------

Hovedproduktion:	Planteavl	52%	9%	11%		9%	20%	2%	25%	9%	44
	Kvægbrug	43%				14%	29%			43%	7
	Svineproduktion	91%				9%	23%			5%	22
	Andet								100%		1
Alder:	Til og med 39 år	57%	10%	14%		19%	14%		24%	10%	21
	40 - 49 år	70%		4%		7%	30%		4%	19%	27
	50 år +	58%	8%	4%		4%	19%	4%	31%	4%	26
	Mand	62%	5%	7%		10%	22%	1%	19%	11%	73
Køn:	Kvinde	100%									1
Total		62%	5%	7%		9%	22%	1%	19%	11%	74

Betingelse: Har modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

#### Spørgsmål 6: På hvilken form er informationerne i givet fald modtaget?

Fleste svarmuligheder	Nyhedsbreve	SMS	Markedsøg	Fagpress	Telefonisk	Reklamer	Internet	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
Hovedproduktion:	Planteavl	75%		14%	5%	2%	20%	7%	11%	44
	Kvægbrug	29%		14%		29%	14%		43%	7
	Svineproduktion	68%		23%	9%	27%	5%	5%	9%	22
	Andet	100%								1
Alder:	Til og med 39 år	81%		10%	10%	10%	14%		10%	21

	<b>40 - 49 år</b>	67%	7%	11%	22%	4%	11%	7%	22%	27
	<b>50 år +</b>	62%	19%	12%	8%	15%	12%	8%	8%	26
<b>Køn:</b>	<b>Mand</b>	68%	12%	11%	14%	4%	14%	7%	14%	73
	<b>Kvinde</b>	100%								1
	<b>Total</b>	69%	12%	11%	14%	4%	14%	7%	14%	74

Betingelse: Har modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

#### Spørgsmål 7: Blev sprøjting mod bladlus anbefalet?

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	%	%	Antal
<b>Hoved- produktion:</b>				
Planteavl	77%	23%	44	
Kvægbrug	43%	57%	7	
Svineproduktion	64%	36%	22	
Andet		100%	1	
<b>Alder:</b>				
Til og med 39 år	62%	38%	21	
40 - 49 år	63%	37%	27	
50 år +	81%	19%	26	
<b>Køn:</b>				
Mand	68%	32%	73	
Kvinde	100%		1	
<b>Total</b>	69%	31%	74	

Betingelse: Har modtaget information om behov for at sprøjte mod bladlus. Jvf. spørgsmål 4.

**Spørgsmål 8: Har du kigget efter bladlus i dine vintersædmarker i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	Antal	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	67%	33%	57
	Kvægbrug	58%	42%	12
	Svineproduktion	74%	26%	31
	Andet	100%	2	
Alder:	Til og med 39 år	67%	33%	27
	40 - 49 år	70%	30%	37
Køn:	50 år +	63%	37%	38
	Mand	66%	34%	101
	Kvinde	100%	1	
Total		67%	33%	102

**Spørgsmål 9: Hør du fundet bladlus i nogle af dine vintersædmarker i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej	
	%	Antal	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	50%	50%	38
	Kvægbrug	29%	71%	7
	Svineproduktion	57%	43%	23

	Til og med 39 år	44%	56%	18
Alder:	40 - 49 år	65%	35%	26
	50 år +	38%	63%	24
Køn:	Mand	49%	51%	67
	Kvinde	100%	1	
Total		50%	50%	68

Betingelse: Har kigget efter bladlus i vintersædsmarker i efteråret 2007. Jvf. spørgsmål 8

Spørgsmål 10: Har du sprøjtet mod bladlus i nogle af dine vintersædsmarker i efteråret 2007?

Vandret %-beretning	Ja		Nej	
	%	%	%	Antal
Planteavl	58%	42%		57
Kvæggrug	17%	83%		12
Hoved- produktion:				
Svineproduktion	58%	42%		31
Andet		100%	2	
Til og med 39 år	52%	48%		27
Alder:				
40 - 49 år	54%	46%		37
50 år +	50%	50%		38
Køn:				
Mand	52%	48%		101
Kvinde		100%	1	
Total	52%	48%		102

**Spørgsmål 13: Hvorfor har du sprøjtet?**

Flere svarmuligheder	Flk vejledning fra konsulent	Omkostninger er små i forhold til risiko	Har vurderet, at der var et behov	Jeg fandt bladlus	Andet, noter:	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	12%	33%	18%	48%	18%	33
	Kvægbrug			50%	50%	50%	2
	Svineproduktion	17%	33%	22%	61%	22%	18
Alder:	Til og med 39 år	14%	43%	29%	50%	21%	14
	40 - 49 år	5%	40%	30%	55%	20%	20
	50 år +	21%	16%	5%	53%	21%	19
Køn:	Mand	13%	32%	21%	53%	21%	53
	Total	13%	32%	21%	53%	21%	53

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 14: Har den højere kornpris haft betydning for din beslutning om at sprøjte?**

Vandret %-beregning	Ja		Nej		Antal
	%	%	%	%	
Hoved- produktion:	Planteavl	21%	79%	33	33
	Kvægbrug		100%	2	
	Svineproduktion	17%	83%	18	

Alder:	Til og med 39 år	29%	71%	14	
	40 - 49 år	20%	80%	20	
	50 år +	11%	89%	19	
Køn:	Mand	19%	81%	53	
	Total	19%	81%	53	
					Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

Spørgsmål 15: I hvor mange procent af dine vinterbygmarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?

Vandret %-beregning	En fjerde del		Halvdelen til næsten alle		Alle	Har ikke vinterbyg- marker	Ved ikke/vil ikke svare	Antal
	%	%	%	%				
Hoved- produktion:	Planteavl	9%		42%	48%			33
	Kvægbrug				100%			2
	Svineproduktion		11%	83%				18
Alder:	Til og med 39 år	7%	7%	64%	14%	7%	14	
	40 - 49 år	5%	5%	60%	30%			20
	50 år +	5%		42%	53%			19
Køn:	Mand	6%	4%	55%	34%	2%	53	
	Total	6%	4%	55%	34%	2%	53	
								Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

Spørgsmål 16: Hvor mange gange har du typisk sprøjtet mod bladlus i vinterbyg i efteråret 2007?

Vandret %-beregning		Under 1 gang	1 gang	2 gange	3 gange	Ved ikke/vil ikke svare	
		%	%	%	%	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	6%	59%	18%	6%	12%	17
	Svineproduktion	6%	83%	6%	6%	6%	18
	Til og med 39 år	17%	50%	17%	8%	8%	12
Alder:	40 - 49 år		93%		7%		14
	50 år +		67%	11%		22%	9
	Total		6%	71%	9%	9%	35
Køn:	Mand		6%	71%	9%	9%	35
	Total		6%	71%	9%	9%	35

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vinterbygmarker Jvf. spørgsmål 15.

Spørgsmål 17: I hvor mange procent af dine vinterhvedemarker har du sprøjtet mod bladlus i efteråret 2007?

Vandret %-beregning		En fjerde del	En fjerde del til halvdelen	Halvdelen til næsten alle	All	Har ikke vinterhvede-markør	Ved ikke/vil ikke svare	
		%	%	%	%	%	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	15%	3%	33%	45%		3%	33
	Kvægbrug	50%					50%	2
	Svineproduktion	6%	17%	22%	44%	6%	6%	18
Alder:	Til og med 39 år	7%	14%	14%	64%			14
	40 - 49 år	20%		30%	40%	5%	5%	20
	50 år +	11%	11%	37%	32%		11%	19

Køn:	Mand	13%	8%	28%	43%	2%	6%	53
Total		13%	8%	28%	43%	2%	6%	53
Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.								

**Spørgsmål 18: Hvor mange gange har du typisk sprøjtet mod bladlus i vinterhvede i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Under 1 gang				3 gange		Ved ikke/vil ikke svare	
	%	%	%	%	%	%	%	Antal
Planteavl	12%	79%	6%	3%				33
Kvægbrug		100%						2
Svineproduktion	6%	82%	6%			6%		17
Til og med 39 år	14%	71%	7%	7%				14
Alder: 40 - 49 år	5%	89%	5%					19
50 år +	11%	79%	5%			5%		19
Køn: Mand	10%	81%	6%	2%		2%		52
Total	10%	81%	6%	2%		2%		52

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vinterhvedemarker. Jvf. spørgsmål 17.

**Spørgsmål 19: Hvilkken dosis har du typisk brugt mod bladlus i vinterhvede i efteråret 2007?**

Vandret %-beregning	Fluid dosis				Halv dosis		Kvar dosis		Ved ikke	
	%	%	%	%	%	%	%	%	Antal	
Hoved- produktion: Planteavl	6%	30%	33%	30%					33	

	Kvægbrug	50%	50%	2
	Svineproduktion	22%	28%	17%
Alder:	Til og med 39 år	7%	36%	21%
	40 - 49 år	10%	40%	15%
	50 år +	16%	16%	35%
Køn:	Mand	11%	30%	37%
	Total	11%	30%	26%
				19
				32%
				53

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 20: Vil du også sprøjte mod bladlus i det kommende efterår?**

Vandret %-beregning	Ja	Nej	Kun ved behov	Ved ikke	
	%	%	%	%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	39%	3%	39%	18%
	Kvægbrug	50%		50%	2
	Svineproduktion	39%		56%	6%
Alder:	Til og med 39 år	50%		36%	14%
	40 - 49 år	45%		55%	20
	50 år +	26%	5%	42%	26%
Køn:	Mand	40%	2%	45%	13%
	Total	40%	2%	45%	13%
					53

Betingelse: Har sprøjtet mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf. spørgsmål 10.

**Spørgsmål 21:** Har du også i tidligere år sprøjtet mod bladlus om efteråret?

		Vandret %-beregning			Aldrig			Enkelte gange			Oftere end hvert 3. år		
			%	%		%	%		%	%		%	Antal
Hoved- produktion:	Planteavl	Planteavl	58%	27%		15%							33
	Kvægbrug	Kvægbrug	100%										2
	Svineproduktion	Svineproduktion	78%	22%									18
	Til og med 39 år	Til og med 39 år	50%	29%		21%							14
Alder:	40 - 49 år		65%	25%		10%							20
	50 år +		79%	21%									19
Køn:	Mand	Mand	66%	25%		9%							53
Total			66%	25%		9%							53

Betingelse: Har sprøjter mod bladlus i vintersædsmarker. Jvf spørgsmål 10.

**Spørgsmål 22:** Har du oplevet at have havterosot i dine vintersædsmarker?

Vandret %-beregning	Planteavl	Ja		Nej	
		%	%	%	%
Hoved- produktion:	Planteavl	68%	32%	57	
	Kvægbrug	42%	58%	12	
	Svineproduktion	65%	35%	31	
	Andet		100%	2	

	Til og med 39 år	56%	44%	27
Alder:	40 - 49 år	70%	30%	37
	50 år +	61%	39%	38
Køn:	Mand	63%	37%	101
	Kvinde		100%	1
Total		63%	37%	102

Spørgsmål 23: Har dine naboer haft havrestødt i deres vintersædsmarker?

Vandret %-beretning	Ja			Antal
	%	%	Ved ikke	
Hoved- produktion:				
Planteavl	56%	26%	18%	57
Krægbrug	50%	33%	17%	12
Svineproduktion	65%	10%	26%	31
Ardet	50%		50%	2
Til og med 39 år	52%	30%	19%	27
Alder:				
40 - 49 år	68%	16%	16%	37
50 år +	53%	21%	26%	38
Køn:				
Mand	58%	21%	21%	101
Kvinde		100%		1
Total	58%	22%	21%	102

# 1 Konsulentindberetninger

## 1.1 Resultatet af konsulenternes indberetninger for vinterbyg i foråret 2008

Gennemsnitlig pct. planter m bladlus i eftersædet 2007	Sprøjlet:	Angrebsgrad i sprøjlet:	Hvis sprøjlet: Antal sprøjninger?	I: sprejning: Udviklingsstadiu:	Middelvægt:	Procent dosis:	2. sprejning: Udviklingsstadiu:	Middelvægt:	Procent dosis:	Hvor mange gange	Konsulent- nummer:	Konsulentens navn:
Ålgrøde: Sødato: 6.- 10. Vinterbyg september 6.- 10.	Ja	0 procent	0 blade	Fastac 50	50	1 gang	CyperbifT	100	0	0	426	Aksel B Ravn
Vinterbyg september 6.- 10.	Ja	0 procent	1 3-4 blade	Mavrik 2F	25	0	CyperbifT	100	0	0	426	Aksel B Ravn Kasper Holm Kristensen
Vinterbyg september 6.- 10.	Nej	0 procent				0	CyperbifT	100	0	0	441	Anders Kjær
Vinterbyg september 6.- 10.	Ja	1-5 procent	1 3-4 blade	Cypermethrin	100	0	CyperbifT	100	0	0	551	Anders Kjær
Vinterbyg september 6.- 10.	Ja	1-5 procent	1 3-4 blade	Cypermethrin	100	0	CyperbifT	100	0	0	551	Anders Kjær
Vinterbyg september 11.- 20.	Ja	0 procent	1 3-4 blade	Fastac 50	100	0	CyperbifT	100	0	0	551	Anders Kjær
Vinterbyg september 11.- 20.	Nej	0 procent				0	CyperbifT	100	0	0	603	Louise Westenholz
Vinterbyg september 11.- 20.	Nej	6-10 procent				0	CyperbifT	100	0	0	603	Louise Westenholz
Vinterbyg september 11.- 20.	Ja	0 procent	0 blade	CyperbifT	50	0	CyperbifT	100	0	0	713	Kresten Mathiesen
Vinterbyg september 11.- 20.	Ja	1-5 procent	1 3-4 blade	Cypermethrin	50	0	CyperbifT	100	0	0	730	Finn Olsen
Vinterbyg september 11.- 20.	Nej	0 procent				0	CyperbifT	100	0	0	730	Finn Olsen
Vinterbyg september 11.- 20.	Ja	0 procent	0 blade	Karate 2.5 WG	50	0	CyperbifT	100	0	0	800	Ulla Jakobsen
Vinterbyg september 11.- 20.	Nej	1-5 procent				1 gang	CyperbifT	100	0	0	864	Torben Justesen

6.-10.	Vinterbyg	september 11.-20.	7	Nej	0 procent					0	0	Poul Erik Jørgensen
	Vinterbyg	september 11.-20.	43	Ja	1-5 procent	0 procent				0	0	Jørgen Dabelsteen
	Vinterbyg	september 11.-20.	2	Nej	1-5 procent					0	0	Hansen
	Vinterbyg	september 11.-20.	1	Nej	0 procent					0	0	Kirsten Nielsen
	Vinterbyg	september 11.-20.								0	0	Christian Iuel
										50		
												Cyperb/IT Cypermethrin

## **1.2 Resultatet af konsulenternes indberetninger for vinterhvede i foråret 2008**

Gennemsnitlig pct. planter m. bladlus i efteråret 2007	Afgrøde:	Sædato: 6.-10. september	Sprøjte:	Angrebsgrad i sprøjte:	Angrebsgrad i sprøjte:	Hvis sprøjtet: 1. sprejtning: Antal sprøjtinger?	Udriftsgren:	Middelevnag:	Procent dosis:	2. sprejtning: Udviklingstid:	Hvor mange gange i 2005?	Konsulent- nummer:
Vinterhvede	Sædato: 11.-20. september	4	Ja	1-5 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	426	Aksel B Ravn
Vinterhvede	september 6.-10.	4	Ja	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	426	Aksel B Ravn
Vinterhvede	september 11.-20.	3	Ja	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	426	Aksel B Ravn
Vinterhvede	september 6.-10.	1	Ja	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	426	Aksel B Ravn
Vinterhvede	september 6.-10.	0	Nej	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	426	Kasper Holm
Vinterhvede	Før 5. september 11.-20.	0	Nej	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	441	Kristensen
Vinterhvede	september 11.-20.	0	Nej	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	Fastac 50	50	0 gange	0 gange	441	Kasper Holm
Vinterhvede	september 11.-20.	1	Ja	0 procent	0 procent	1-2 blade	Cyperbit/IT Cypermethrin	100	0 gange	0 gange	441	Kasper Holm
Vinterhvede	september 11.-20.	1	Ja	0 procent	0 procent	2-1-2 blade	Karate 2.5 WG Cyperbit/IT Cypermethrin	100	2 gange	1 gang	551	Kristensen
Vinterhvede	september 6.-10.	1	Ja	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	5-6 blade	100	1 gang	0 gange	551	Anders Kjaer
Vinterhvede	september 11.-20.	2	Nej	0 procent	0 procent	1-3-4 blade	W/G	100	0 gange	0 gange	603	Anders Kjaer
Vinterhvede	september 11.-20.	1	Nej	0 procent	11-20 procent	1-3-4 blade	Cyperbit/IT Cypermethrin	100	0 gange	0 gange	603	louise western
Vinterhvede	september 11.-20.	2	Ja	0 procent	21-50 procent	1-3-4 blade	Cyperbit/IT Cypermethrin	50	0 gange	0 gange	713	Kresten Math

Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Kresten Mathias
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	5-6 blade	Cyperb/II	50	Kresten Mathias
Vinterhvede	6.-10. september	Ja	1-5 procent	0 procent	1	5-6 blade	Karate 2,5 WG	50	Kresten Mathias
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	1-5 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Kresten Mathias
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	1-5 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	1-5 procent	1-5 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Finn Olsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Ulla Jakobsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	1-2 blade	Fastac 50	50	Ulla Jakobsen
Vinterhvede	11.-20. september	Nej	0 procent	0 procent	0	0 gange	0 gange	800	Mirella Helms
Vinterhvede	11.-20. september	Nej	0 procent	0 procent	0	0 gange	0 gange	816	Mirella Helms
Vinterhvede	11.-20. september	Nej	0 procent	0 procent	0	0 gange	0 gange	816	Mirella Helms
Vinterhvede	11.-20. september	Nej	0 procent	0 procent	0	0 gange	0 gange	816	Mirella Helms
Vinterhvede	11.-20. september	Nej	0 procent	0 procent	0	0 gange	0 gange	844	Torben Justesen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	25	Poul Erik Jørgen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	25	Jesper Juul Ulrik
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	1-2 blade	Fastac 50	50	0 gange
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	1-2 blade	Fastac 50	50	0 gange
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	1-2 blade	Cyperb/II	50	Torben Kejser
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	1-5 procent	1-5 procent	1	1-2 blade	Cypermethrin	50	Torben Kejser
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	6-10 procent	1-5 procent	1	1-2 blade	Mavrik 2F	25	Jørgen Dabelsteen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	0 procent	0 procent	1	3-4 blade	Mavrik 2F	25	Hans Nielsen
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	11-20 procent	1-5 procent	1	3-4 blade	Cyperb/II	50	Charlotte Harst
Vinterhvede	11.-20. september	Ja	1-5 procent	1-5 procent	1	3-4 blade	Cypermethrin	50	Charlotte Harst



# 1 Spørgeskema brugt til konsulentindberetninger

## HAVRERØDSOT

---

Postnummer, hvor marken ligger:

Lokalitetsnavn brugt ved indberetning til registreringsnettet:

**Afgrøde:**

- (1)  Vinterbyg
- (2)  Vinterhvede

**Sådato:**

- (1)  Før 5. september
- (2)  6. - 10. september
- (3)  11. - 20. september
- (4)  21. - 30. september
- (5)  Efter 30. september

**Sprøjtet:**

- (1)  Ja
- (2)  Nej

**Angrebsgrad af havrerødsot i usprøjtet:**

- (1)  0 procent
- (2)  1-5 procent
- (3)  6-10 procent
- (4)  11-20 procent
- (5)  21-50 procent
- (6)  over 50 procent

**Angrebsgrad af havrerødsot i sprøjtet:**

- (1)  0 procent
- (2)  1-5 procent
- (3)  6-10 procent

- (4)  11-20 procent
- (5)  21-50 procent
- (6)  over 50 procent

**Hvis sprøjtet: Antal skadedyrssprøjtninger?**

- (1)  1
- (2)  2
- (3)  3

**1. sprøjtning:**

**Udviklingstrin:**

- (1)  0-1 blad
- (2)  1-2 blade
- (3)  3-4 blade
- (4)  5-6 blade
- (5)  over 6 blade

**Middelvalg:**

- (1)  Cyperb/IT Cypermethrin
- (2)  Fastac 50
- (3)  Karate 2,5 WG
- (4)  Mavrik 2F
- (5)  Pirimor

**Procent dosis:**

- (1)  1/1 dosis
- (2)  1/2 dosis
- (3)  1/4 dosis

**2. sprøjtning:**

**Udviklingstrin:**

- (1)  0-1 blad
- (2)  1-2 blade
- (3)  3-4 blade
- (4)  5-6 blade
- (5)  over 6 blade

**Middelvalg:**

- (1)  Cyperb/IT Cypermethrin
- (2)  Fastac 50
- (3)  Karate 2,5 WG

- (4)  Mavrik 2F
- (5)  Pirimor

**Procent dosis:**

- (1)  1/1 dosis
- (2)  1/2 dosis
- (3)  1/4 dosis

**3. sprøjtning:**

**Udviklingstrin:**

- (1)  0-1 blad
- (2)  1-2 blade
- (3)  3-4 blade
- (4)  5-6 blade
- (5)  over 6 blade

**Middelvalg:**

- (1)  Cyperb/IT Cypermethrin
- (2)  Fastac 50
- (3)  Karate 2,5 WG
- (4)  Mavrik 2 F
- (5)  Pirimor

**Procent dosis:**

- (1)  1/1 dosis
- (2)  1/2 dosis
- (3)  1/4 dosis

**Hvor mange gange har landmanden sprøjtet en tilsvarende mark mod bladlus i efteråret 2006?**

- (1)  0 gange
- (2)  1 gang
- (3)  2 gange
- (4)  3 gange

**Hvor mange gange har landmanden sprøjtet en tilsvarende mark mod bladlus i efteråret 2005?**

- (1)  0 gange
- (2)  1 gang
- (3)  2 gange

(4)  3 gange

Konsulentnummer: \_\_\_\_\_

Konsulentnavn: \_\_\_\_\_