

Dato: 25.04.2008

Ref.: MSP/MV

J.nr.: 2008-250-0009

Notat vedr.: Oplysninger om fiskebestandene i område 22 over en 10-årig periode og om kvoter til fiskere i denne periode

Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri blevet bedt om at oplyse om fiskebestanden i område 22 over en 10-årig periode og om kvoter til fiskere i denne periode.

Der udarbejdes ikke en separat biologisk rådgivning om bestandenes størrelse i område 22, og der fastsættes ikke kvoter særskilt for område 22. Bestandene vurderes i stedet for et større område, nemlig område 22, 24 og 23 (den vestlige Østersø, Bælthavet og Øresund) for torsk og sild. For rødspætter og brisling gives der kvoter for den Vestlige og Østlige Østersø, samt Bælthavet og Øresund tilsammen.

Beskrivelser af bestandene:

Torsk

Den vestlige Østersø torsk har siden begyndelsen af 1970erne varieret en del med den største gydebestand i 1980 på 56 000 t. På 10 år faldt bestanden til det laveste registrerede niveau i 1992 på ca. 10 000 t. Herefter blev fiskeriet kraftigt reduceret og bestanden begyndte at komme sig. I de sidste 15 år har gennemsnits gydebestanden ligget på ca. 25 000 t og i 2007 er gydebestanden vurderet til at ligge lidt over dette gennemsnit. Da fiskeridødeligheden er høj er torsken meget afhængig af tilgangen af yngel, som i de sidste 4 år og har været noget under gennemsnittet.

Sild

Gydebestanden hos den vestlige Østersø sild faldt i starten af 1990erne fra ca. 300 000 t til lidt over 100 000 t i midten af 1990erne og siden har gydebestanden været svagt stigende til det niveau vi har i dag på ca. 200 000t. Landingerne har i den samme periode været stærkt faldende, men har siden 2001 været forholdsvis stabile. Der har de senere år været meget dårlig rekruttering til bestanden.

Brisling

I 1990erne var gydebestanden for brisling i Østersøen over 1 million tons, med de største forekomster i 1996-1997. De niveauer var langt højere end gydebestanden observeret i begyndelsen af 1980erne. Fra 1997 faldt bestanden igen og efter år 2000 var bestanden på ca. det halve af hvad den var i 1996-97. Siden 2005 er der igen sket en stigning i bestanden. Tilgangen af yngel har dog været mindre i de sidste par år og bestanden er begyndt at falde igen.

Rødspætte

Rødspætte i den vestlige Østersø bliver ikke vurderet separat men betragtes som stærkt forbundet til bestanden i Kattegat. Det vurderes at bestanden af rødspætten i Kattegat så småt er ved at få det bedre, men bestanden er stadig langt fra hvad den var i 1970'erne.

Tunge

Der er i de seneste par år begyndt at komme et fiskeri efter tunger i den vestlige Østersø. Bestanden betragtes som en del af Kattegat bestanden, men der er på nuværende tidspunkt ikke lavet noget særskilt beskrivelse af tunger i den vestlige Østersø