

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 17. juni 2008
Kontor: Regional sundhed
J.nr.: 2008-12140-307
Sagsbeh.: lch
Fil-navn: Dokument 1

**Besvarelse af spørgsmål nr. 416 (Alm. del), som Folketinget -
Sundhedsudvalget har stillet til ministeren for sundhed og fore-
byggelse den 2. juni 2008.**

Spørgsmål 416:

"Ministeren bedes redegøre for, hvorfor de mange dødsfald, der har været blandt psykotiske patienter med dødsårsagen psykose, ikke har givet anledning til initiativer, for at afklare om den reelle dødsårsag er medicin, som der henvises til i artiklerne omdelt på alm. del - bilag 409."

Svar:

Jeg er ikke enig i, at dette område ikke har været genstand for initiativer. Blandt andet udgav Sundhedsstyrelsen i december 2006 en udredning om forbruget af antipsykotika blandt 18-64 årige patienter med skizofreni, mani eller bipolar affektiv sindslidelse. Vedrørende andre initiativer på området henviser jeg til min besvarelse af spørgsmål nr. 419.

Jeg vil dog gerne tilkendegive, at det er min opfattelse, når jeg læser artiklerne fra Nordjyske Stiftstidende, jf. bilag 409, at alle interessenter er enige om, at der er brug for mere viden på dette felt. Den opfattelse deler jeg også.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at Sundhedsstyrelsen til efteråret i samarbejde med bl.a. Lægemiddelstyrelsen vil udarbejde en ny undersøgelse af forbruget af antipsykotiske lægemidler blandt personer over 65 år og blandt 18-65 årige patienter med skizofreni, mani, og bipolar affektiv sindslidelse. Denne undersøgelse vil også omfatte en gennemgang af dødsårsagerne.