

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 20. maj 2009

Sags nr.: 0904168

Sagsbeh.: SUMDRA / Lægemiddelkontoret

Dok nr.: 39720

Besvarelse af spørgsmål nr. 470 (Alm. del), som Folketingets sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 22. april 2009.

Spørgsmål 470:

"Ministeren bedes kommentere materialet vedrørende forebyggelse af selvmordsforsøg via indførelse af pakningsbegrænsninger, jf. SUU alm. del. – bilag 357."

Svar:

Bilag 357 vedrører materiale fremsendt af Merete Nordentoft, overlæge på Bispebjerg Hospital, Charlotte Guldborg, formand for Børnerådet og Leif Hindsted som repræsentant for GlaxoSmithKline, som skitserer problemer, årsager og løsningsmuligheder i forlængelse af programmet "Panodil-pigerne", som blev vist på TV2 den 26. februar 2009. Blandt løsningsmuligheder nævnes pakningsbegrænsninger, og indførelse heraf i bl.a. England.

Jeg vil i den forbindelse henvise til min besvarelse af spørgsmål 396 af 23. marts 2009, hvor følgende fremgik:

"Antallet af selvmordsforsøg og selvmord med svage smertestillende lægemidler faldt i Storbritannien, da der blev indført pakningsbegrænsninger. Desværre kunne den samme entydige udvikling ikke ses i det samlede antal selvmord.

Begrænsningerne i håndkøbssalg af svage smertestillende lægemidler i store pakninger blev indført i Storbritannien i 1998. På apoteker må der højst sælges pakninger med 32 stk., dog op til 100 stk. efter accept af en farmaceut på apoteket. Uden for apotekerne må pakningerne højst indeholde 16 stk.

Ifølge *National Statistics* har selvmordsraten blandt kvinder i Storbritannien været stort set konstant i hele perioden fra 1994 til 2005. I samme periode har der været en svagt faldende tendens blandt mænd.

Der er siden 1998 publiceret en lang række artikler om og lavet flere undersøgelser af effekten af pakningsbegrænsningerne i Storbritannien. Hvor erfaringerne de første år var positive, er billedet siden blevet mere uklart. F.eks. viser en undersøgelse af forgiftninger i England og Wales, at der skete et fald i antallet af dødsfald efter forgiftning med paracetamol i perioden 1993 til 2002, uden at faldet entydigt kunne kædes sammen med indførelsen af pakningsbegrænsninger i 1998."

Lægemiddelstyrelsen har i april måned lavet en litteraturgennemgang, som belyser effekterne på selvmordsforsøg/selv mord af en begrænsning i pakningsstørrelse/receptbelægning for svage smertestillende lægemidler. Gennemgangen dækker undersøgelser af ændringer i adgangen til svage smertestillende lægemidler i Storbritannien, Norge, Canada og Frankrig. Konklusionen på litteraturgennemgangen

er, at der trods en betragtelig mængde undersøgelser ikke findes entydig evidens for, at restriktionerne har haft effekt i form af et fald i antallet eller alvoren af forgiftninger, eller i antallet af selvmord med paracetamol.

Jeg kan til orientering oplyse, at Sverige pr. 1. juni 2009 indfører receptbelægning af store pakninger med svage smertestillende lægemidler. Det fremgår af en meddelelse fra Läkemedelsverket, at receptbelægning sker for at mindske risikoen for paracetamolforgiftninger.

Indførelse af pakningsbegrænsninger, der vanskeliggør adgangen til lettere smertestillende medicin, må forventes at reducere antallet af selvmord eller forsøg herpå, med denne type lægemidler. Det betyder dog ikke, som tallene fra Storbritannien og litteraturgennemgangen indikerer, at antallet af selvmord og forsøg herpå falder.

Svenskernes beslutning om at indføre receptbelægning af store pakninger med svage smertestillende lægemidler ændrer ikke ved denne opfattelse, men jeg vil selvfølgelig følge den svenske indsats.