

Folketingets Sundhedsudvalg



Folketingets Sundhedsudvalg har den 2. december 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 204 (alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 204:

”Ministeren bedes redegøre for hvilke tiltag han har taget – udover at Sundhedsstyrelsen har indskærpet overfor de danske hospitaler at man – igen – skal følge vejledningen om blodtransfusioner fra 2007 – som følge af, at der fortsat foretages alt for mange blodtransfusioner i Danmark, og at der fortsat i vid grad gives blodtransfusioner til patienter med en blodprocent over 6 mmol/l. Der henvises til Lægemiddelstyrelsens ”Redegørelse for blodområdet 2008.”

Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K  
Tlf. +45 7226 9000  
Fax. +45 7226 9001  
E-mail [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
Hjemmeside [www.sum.dk](http://www.sum.dk)

Dato: 12. januar 2010  
Sags nr.: 0909380  
Sagsbeh.: hbj  
Dok nr.: 157215

Svar:

Jeg har i anledning af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

”Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at vejledning om blodtransfusion blev offentliggjort den 20. december 2007. Erfaringsmæssigt tager det nogen tid før Styrelsens vejledning implementeres i de lokale instrukser, hvorfor den gunstige udvikling i blodforbruget, som fremgår af Lægemiddelstyrelsens redegørelse for 2008, forventes forstærket fremover.

Af Lægemiddelstyrelsens redegørelse fremgår, at der i 2008 er transfunderet 16.000 færre erytrocyt-enheder (røde blodlegemer) i 2008 end i 2007, hvilket svarer til en nedgang på 4,6 %. Derimod blev der anvendt knapt 9.000 trombocyt-enheder (blodplader) mere i 2008 end i 2007, hvilket var en stigning på cirka 7 %. Der er også anvendt lidt mere frisk frosset plasma i 2008 end i 2007. Årsagen til stigningen i brugen af trombocytter og frisk frosset plasma samtidig med faldet i brugen af erytrocytter kan skyldes, at lægerne er blevet opmærksomme på at give balanceret blodkomponentterapi ved blødninger, som anført i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Vejledningen er efterfølgende fulgt op af en meddelelse i Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev af oktober 2009 ”For mange patienter får blodtransfusioner”.

Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd har desuden drøftet diverse initiativer for at nedsætte blodforbruget yderligere. Rådet er opmærksomt på, at der er flere initiativer i gang på landets sygehuse for at nedsætte blodforbruget. Rådet har derfor valgt, at følge udviklingen tæt, og afvente offentliggørelsen af resultaterne af de mange initiativer, før rådet iværksætter eventuelle yderligere initiativer.”

Jeg kan tilslutte mig, at Sundhedsstyrelsen afventer en status for allerede iværksatte initiativer, inden styrelsen overvejer og iværksætter nye initiativer til begrænsning af antallet af blodtransfusioner.

Med venlig hilsen

Jakob Axel Nielsen / Hanne Bonne Jørgensen