

Folketingets Sundhedsudvalg



Folketingets Sundhedsudvalg har den 9. december 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 223 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 223:

'Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danskere, der er blevet behandlet med Tamiflu i forbindelse med H1N1 epidemien og hvad erfaringerne med anvendelsen af dette lægemiddel har været.'

Svar:

Til brug for min besvarelse har jeg indhentet en udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen har oplyst følgende:

"Det totale salg af Tamiflu® er i nedenstående skema opgjort for perioden april, hvor H1N1 epidemien startede, til oktober. Dette giver det følgende resultat:

Modtager	Antal pakninger
Enkeltperson	15.722
Sygehus	2.645
Læge til brug i praksis	2.337
Leverance	1.360
Andet	912
Ikke angivet	175
Tandlæge til brug i praksis	118
Dyrlæge til brug i praksis	22
I alt	23.291

For perioden 1. november til 13. december 2009 har Lægemiddelstyrelsen kun data fra Medicinprofilen, dvs. udleveringer fra apotekerne til enkeltpersoner. Af denne fremgår det, at 20.069 pakninger er udleveret.

Ud fra disse data kan det estimeres, at der formentlig er rundet et totalsalg på 50.000 pakninger for hele perioden fra 1. april til 13. december 2009.

Lægemiddelstyrelsen har derfor et godt overblik over, hvor mange pakker Tamiflu®, der er solgt. Men hvor mange personer, der heelt har været i behandling, vides ikke, da der kan ligge mange uåbnede pakninger i hjemmene. Da Tamiflu® under den aktuelle pandemi ikke er givet som led i et kontrolleret studie, er det ikke muligt at opgøre, hvor

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail sum@sum.dk
Hjemmeside www.sum.dk

Dato: 11. januar 2010
Sags nr.: 0909541
Sagsbeh.: SUM-
LBU/Sundhedsjuridisk center
Dok nr.: 160961

mange personer, der måtte have haft effekt, hverken i behandlings- eller i forebyggelsesøjemed.

Bivirkningsprofilen for Tamiflu® er velkendt efter anvendelse til et meget stort antal patienter. Både de danske og de samlede internationale erfaringer med bivirkninger viser, at der er en fuldt ud acceptabel balance mellem de observerede bivirkninger og effekten af Tamiflu®.”

Jeg kan henholde mig til Lægemiddelstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Jakob Axel Nielsen / Lisette Bulig