

Besvarelse af spørgsmål nr. S 178, som medlem af Folketinget Simon Emil Ammitzbøll har stillet til ministeren for Sundhed og Forebyggelse den 20. oktober 2009.

Spørgsmål nr. S 178:

”Hvad agter ministeren at gøre i forhold til loven omhandlende tobak, der indtages oralt i portioner (snus), set i lyset af den nylig offentliggjorte undersøgelse i Storbritannien, publiceret i tidsskriftet BMC Medicin, der påviser, at der stort set ikke er helbredsmæssige konsekvenser ved snus og tyggetobak?”

Svar:

Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer, om nye undersøgelser, ny forskning mv. tilvejebringer det nødvendige faglige grundlag til at ændre eksisterende vejledninger, faglige udmeldinger mv.

Sundhedsstyrelsen har overfor mig oplyst, at der er gennemført adskillige epidemiologiske undersøgelser, der dokumenterer, at sygdomsrisikoen ved at anvende røgfri tobak (snus, skrå) er betydeligt mindre, end det er tilfældet ved tobaksrygning. Dette gælder i forhold til såvel kræft som hjerte-karsygdomme. Der ses dog en øget risiko for visse kræftformer og hjertekarsygdom sammenlignet med ikke tobaksbrugere.

Den særlige svenske form for snus, der findes i Sverige (moist snuff) er ikke tilladt at sælge i de øvrige EU-lande i henhold til tobaksvaredirektivet. Den mindre risiko for sygdom forbundet med dette produkt i forhold til røgtobak har i de senere år givet anledning til forslag om ophævelse af det europæiske forbud.

Synspunktet er, at et centralt element i en ”harm reduction” strategi vil være at få rygere til at konvertere til dette produkt i stedet for at ryge. Det svenske eksempel med forholdsvis få rygere bruges som et afgørende argument.

En svensk undersøgelse fra 2006 dokumenterer, at 4 ud af 10 snusbrugere har påbegyndt sit tobaksbrug med snus, og at næsten lige så mange ryger dagligt eller lejlighedsvis samtidig med, at de anvender snus. Samtidig angiver meget få eksrygere, at de har anvendt snus i forbindelse med rygestopet.

Sundhedsstyrelsen peger således på, at snusbrugere har en øget sygdomsrisiko i forhold til ikke tobaksbrugere, at snusbrugere generelt har et højere nikotinniveau i blodet end rygere og derfor er mere afhængige, at snus ikke synes at være et væsentligt bidrag i forbindelse med rygestop, og at en større del af de unge via snus vil blive tilvænnet tobak med muligheden for også at blive rygere.

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail sum@sum.dk
Hjemmeside www.sum.dk

Dato: 29. oktober 2009
Sags nr.: 0908243
Sagsbeh.: SUMIST/Center for
sundhed og psykiatri
Dok nr.: 125693

Jeg har på den baggrund aktuelt ikke planer om på EU niveau at ville arbejde for en ændring af tobaksvaredirektivet.

Med venlig hilsen

Jakob Axel Nielsen / Iben Stadi