



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 7. februar 2011
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMLFI
Sags nr.: 1101103
Dok nr.: 429591

Folketingets Sundhedsudvalg har den 24. januar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 383 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 383:

” Ministeren bedes oplyse, hvor meget de praktiserende læger har udskrevet af benzodiazepiner de seneste 3 år fordelt på regioner.”

Svar:

Jeg har bedt Lægemiddelstyrelsen om at foretage en opgørelse af de alment praktiserende lægers ordinationer af benzoediazepiner og benzoediazepinlignende midler for 2008-2010.

Tabel 1 og 2 nedenfor viser salget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler i 2008, 2009 og 2010. Tallene er baseret på de alment praktiserende lægers ordinationer til brug i egen praksis og til brug for enkeltpersoner og er opgjort i millioner definerede døgndoser (DDD) og DDD per 1.000 indbyggere per døgn. Opgørelserne er baseret på data fra Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister.

Tabel 1 viser det eksakte antal døgndoser fordelt på regioner:

Tabel 1. Salg af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, hvor receptudsteder er en alment praktiserende læge, målt i millioner DDD, 2008 – 2010

	2008	2009	2010
Region Nordjylland	9,4	7,2	6,3
Region Sjælland	13,1	11,1	10,4
Region Midtjylland	14,6	11,7	10,5
Region Syddanmark	17,5	14,4	13
Region Hovedstaden	21,3	18,1	16,9
Total	75,9	62,5	57,1

Det eksakte antal døgndoser siger dog ikke så meget om, hvorvidt salget i den ene region er større eller mindre end i de øvrige, fordi salget ikke er fordelt på det samme antal borgere. Det er derfor nødvendigt at justere for befolkningsantallet i regionen, hvis salget skal sammenlignes. Salget i tabel 2 er målt i DDD per 1.000 indbyggere per døgn:

Tabel 2. Salg af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, hvor receptudsteder er en alment praktiserende læge, målt i DDD per 1.000 indbyggere per døgn, 2008 – 2010

	2008	2009	2010
Region Midtjylland	32,3	25,6	22,9
Region Hovedstaden	35,4	29,9	27,6
Region Syddanmark	40,2	32,9	29,8
Region Nordjylland	44,4	34	30
Region Sjælland	43,9	37,2	34,6
Total	38	31,1	28,3

Tabel 3. Salget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, hvor receptudsteder er en alment praktiserende læge, målt i hhv. DDD og DDD per 1.000 indbyggere per døgn, 2001 - 2010

År	DDD	DDD/1.000 indb./døgn
2001	97.921.860	50,2
2002	97.539.628	49,8
2003	96.994.586	49,4
2004	95.036.629	48,2
2005	91.540.181	46,3
2006	87.538.196	44,2
2007	83.425.303	42,0
2008	75.923.673	38,0
2009	62.552.066	31,1
2010	57.167.850	28,3

Som det fremgår af tabel 2 og 3 har salget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler været faldende over de sidste ti år. Særligt fra 2008 ses der et markant fald i salget. Faldet skyldes en intensiveret indsats for at nedbringe forbruget. Sundhedsstyrelsen udgav således i 2008 en revideret vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, hvori der blandt andet var nye regler for udstedelse, fornyelse eller generhvervelse af kørekort for brugere af benzodiazepiner. Endvidere udsendte Institut for Rationel Farmakoterapi en række behandlingsvejledninger til både læger, praksismedarbejdere, brugere og pårørende om benzoediazepiner og benzoediazepinlignende midler.

I flere regioner fulgte de regionale lægemiddelkonsulenter og embedslægerne op med særlige initiativer over for de læger, der ordinerede flest benzodiazepiner.

Opgørelsen i tabel 2 viser således, at salget af definerede døgndoser (DDD) per 1.000 indbyggere per døgn samlet set er faldet med ca. 25 pct. fra 2008 til 2010.

Afslutningsvis bemærkes, at Lægemiddelstyrelsen i forhold til opgørelserne har oplyst, at salget af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler i primærsektoren normalt opgøres i enten det totale salg, der indeholder salg til enkeltpersoner og til brug i praksis mv. fra alle receptudstedere - eller i det samlede salg til enkeltpersoner (dvs. ekskl. brug i praksis mv.), der udover or-

dinationer fra praktiserende læger også indeholder ordinationer fra speciallæger, sygehuse m.fl. Der er derfor forskelle i resultaterne mellem de forskellige opgørelser.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Louise Filt