



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

02 FEB. 2011

Dato:
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMJMY
Sags nr.: 1101316
Dok nr.: 430962

Folketingets Sundhedsudvalg har den 24. januar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 386 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 386:

"Ministeren bedes uddybe, hvorledes man er kommet frem til, at der er en komplikationsrate på 10 pct. for gastrisk bypass."

Svar:

Jeg kan oplyse, at den faglige rådgivning, som ministeriet og Danske Regioner har baseret sig på i forbindelse med udarbejdelsen af de retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet, der blev udsendt den 17. december 2010, har trukket på flere kilder.

I Sundhedsstyrelsens "Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark" fra 2008 præsenteres følgende tal for komplikationer ved gastrisk bypass, som patienter som minimum bør informeres om (s.12):

Konverteringsrate 1-2 pct.; anastomoselækage 1-2 pct.; blødning 1-2 pct.; infektion 1 pct.; forsnævring af anastomose 1 pct.; brok 1 pct.; mavesår 2-3 pct. Hertil kommer risiko for død 0,5 pct. Sammenlagt giver disse tal en komplikationsrate ved gastrisk bypass på 8,5 til 12,5 pct.

En anden kilde er årsrapporten fra SOReg, august 2010, der er baseret på operationer fra 2009. (SOReg står for: Scandinavian Obesity Surgery Registry). I årsrapporten anføres det side 13, at gastrisk bypass har 10,5 pct. komplikationer inden for 30 dage.

En tredje kilde er Danske Regioners arbejdsgruppe, der er nedsat i efteråret 2010. Et af medlemmerne, professor, overlæge Bjørn Richelsen, præsenterede følgende komplikationsrater ved gastrisk bypass på en konference om behandling af svær overvægt i Danske Regioner 1. september 2010:

Dødelighed 0,5 pct., alvorlige operative komplikationer 3-4 pct., senere kirurgiske problemer blev anslået til at ligge mellem 5-10 pct., ønske om hudfjernelse blev anslået til 25 pct. og ernæringsproblemer blev skønnet til ca. 60 pct. Bortset fra hudfjernelse og ernæringsproblemer, som har langt højere rater, så vurderes komplikationerne således at udgøre 8,5 til 14,5 pct.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Jesper Myrup