

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K.


Sundhedsstyrelsens udtalelse til SUU 419

Sundhedsstyrelsen er blevet anmodet om at bidrage til *redegørelse for udviklingen i antallet af narkotikarelaterede dødsfald i årene 2001 til 2010*.

Bidrag

Rigspolitiet har registreret narkotikarelaterede dødsfald siden 1970. Registeret omfatter dødsfald, hvor der er sket indberetning til politiet med henblik på medikolegalt ligsyn, og hvor der samtidig foreligger oplysninger om et stofmisbrug. Det drejer sig fx om dødfundne, pludselig uventede døde, ulykker - herunder forgiftninger, drab og selvmord. Dødsfald forårsaget af forgiftning eller anden ulykke, hvor den pågældende havde indtaget narkotika, vil således blandt andet blive registreret i Rigspolitiets register.

Fra midten af 90'erne har antallet af narkotikarelaterede dødsfald registreret i Rigspolitiets register ligget nogenlunde konstant, dog med årlige udsving, og faldende tendens de senere år fra 2005 til 2008. I 2009 blev der registreret 276 narkotikarelaterede dødsfald, hvilket er det højeste antal de senere år. Udviklingen i antal narkotikarelaterede dødsfald fra 1988 til 2009 er vist i figuren nedenfor. De narkotikarelaterede dødsfald fra 2010 er endnu ikke opgjort.



Antal narkotikarelaterede dødsfald alene i årene 2001 til 2009 er vist i tabellen nedenfor.

21. februar 2011
j.nr. 7-310-151/1/BIN

Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. 72 22 74 00
Fax 72 22 74 11
E-post info@sst.dk

Dir. tlf. 7222 7757
E-post cff@sst.dk

Antal narkotikarelaterede dødsfald registreret i Rigspolitiets register fra 2001 til 2009

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rigspolitiets register. I alt	258	252	245	275	275	266*	260**	239*	276
Heraf mænd	211	216	197	211	234	218	207	186	217
Heraf kvinder	47	36	48	63	41	46	50	51	59


* Køn uoplyst for 2 personer

** Køn uoplyst for 3 personer

Side 2
21. februar 2011
Sundhedsstyrelsen

Gennemsnitsalderen ved død er i mange år steget. Tilbage i 1993 var gennemsnitsalderen 33 år, mens den i 2009 var steget til 39,6 år. Gennemsnitsalderen ved død for mænd er i 2009 39,2 år, mens den for kvinder er 40,8 år. Ca. 20 % af samtlige narkotikarelaterede dødsfald årligt sker blandt de unge under 30 år.

Langt de fleste (ca.80 %) narkotikarelaterede dødsfald sker som følge af en forgiftning, mens resten (ca.20 %) sker som følge af vold, sygdom, selvmord eller anden ulykke end forgiftning. I langt de fleste forgiftningsdødsfald er der tale om, at flere stoffer samtidig medvirker til forgiftningen – mere end ét stof bliver fundet i en dødelig dosis. Ligeledes påvises andre stoffer hos den afdøde, såsom benzodiazepiner, alkohol m.m. I nedenstående figur ses det gennemsnitlige antal påviste stoffer (inkluderet alkohol) i blodet hos de narkotikadøde i 2009 i forskellige aldersgrupper.



Som figuren viser, påvises mellem 3 og 4 forskellige stoffer i gennemsnit i forgiftningsdødsfaldene, hvilket dokumenterer et udbredt blandingsbrug blandt dem, der dør. Dette gælder, som det ses af figuren, også blandt de helt unge.

Kari Grasaasen
Specialkonsulent