



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 18. marts 2011
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMCSH
Sags nr.: 1102175
Dok nr.: 465300

Folketingets Sundhedsudvalg har den 15. februar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 442 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jonas Dahl (SF).

Spørgsmål nr. 442:

"Hvilke tiltag har regeringen igangsat for sikre de over 250.000 danskere, der har ubehandlet forhøjet blodtryk?"

Svar:

Forhøjet blodtryk kan forebygges og reduceres ved bl.a. fysisk aktivitet, fornuftige kostvaner – herunder moderat saltindtag – og begrænset alkoholforbrug.

Blandt andet derfor har regeringen også løbende igangsat initiativer på disse tre områder. Jeg kan eksempelvis nævne:

- Den netop indførte højere aldersgrænse for køb af alkohol med høj alkoholprocent
- Der er taget skridt til at iværksætte en national strategi, der skal fremme en markant reduktion i befolkningens saltindtag
- Satspuljerne på forebyggelsesområdet har haft fokus på fysisk aktivitet i forhold til personer med risikobetonet sundhedsadfærd, og der gennemføres årligt motionskampagner målrettet skoleelever

Regeringen har således fokus på at skabe de bedst mulige rammer for en sund levevis - herunder at undgå forhøjet blodtryk.

I forhold til en egentlig opsporing af personer med forhøjet blodtryk har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om et bidrag. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende:

"Graden af en generel screening for forhøjet blodtryk, er ikke et område, der er systematisk belyst, og det kan derfor være vanskeligt at sige, om det vil være en god ide at screene alle personer over 50 år. Der mangler en evidensafklaring for området.

Internationalt anbefales det at screene opportunistisk for risikofaktorer, dvs. når patienter alligevel kommer i almen praksis, fx at tage patientens blodtryk. Sundhedsstyrelsen lægger vægt på at fremme systematisk identifikation og registrering af patienters risikofaktorer som led i kontakten med sundhedsvæsenet, specielt i forhold til kontakten med almen praksis."

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Christian Skov Hansen