



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 17. november 2010
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMJLI
Sags nr.: 1009013
Dok nr.: 358745

Folketingets Sundhedsudvalg har den 21. oktober 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 73 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anne Marie Geisler Andersen (RV).

Spørgsmål nr. 73:

"Hvilke psykiatriske lidelser rammes børn og unge hyppigst af, og hvordan er fordelingen af de forskellige psykiatriske diagnoser hos henholdsvis børn og unge, hvor stor en andel lider eksempelvis af ADHD, depression, spiseforstyrrelse mm.?"

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det skønnes, at i alt ca. 10-20 pct. af børn og unge på et eller andet tidspunkt i opvæksten har brug for hjælp pga. psykiske problemer. I vidt omfang vil sådanne problemer og vanskeligheder være af lettere og/eller forbigående karakter forudsat, at der gives relevant støtte i nærmiljøet til en psykisk og social sund videre udvikling. Kun en væsentlig mindre andel har behov for hjælp fra børne- og ungdomspsykiatrien. Sundhedsstyrelsens børne- og ungdomspsykiatriske følgegruppe har vurderet at ca. 2 pct. af en børne- ungepopulation har behov for et tilbud fra børne- og ungdomspsykiatrien.

Undersøgelser – hovedsagligt internationale - peger på følgende estimater for en række sygdomstilstande, idet sværhedsgraden inden for den enkelte gruppe er varierende.

- Psykoser - ca. 0,5 pct. af en årgang unge indlægges med psykose.
- Depression - ca. 1 pct. af børn i skolealderen og ca. 3- 5 pct. af unge mellem 13-19 år.
- Tvangstilstande - 1-2 pct. af børn og unge.
- Angsttilstande - 2 pct. af børn og 9 pct. blandt unge.
- Spiseforstyrrelser - anorexia nervosa 0,3-1 pct. og bulimia nervosa 1,7-4 pct. blandt unge piger. 1 promille blandt drenge i teenage-alderen.
- Adfærdsforstyrrelser – 2 pct. af 8- årige og 8 pct. af 14-16årige.
- Hyperkinetisk forstyrrelse 1-2 pct. blandt skolebørn. ADHD som er en rummeligere diagnose fra diagnoseklassifikationssystemet DSM-IV omfatter nogle flere og vurderes at omfatte 3-7 pct.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Jesper Lihn