



Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [im@im.dk](mailto:im@im.dk)  
W [www.im.dk](http://www.im.dk)

Folketingets Sundhedsudvalg  
[Udvalg@ft.dk](mailto:Udvalg@ft.dk)

Liselott Blixt  
[Liselott.Blixt@ft.dk](mailto:Liselott.Blixt@ft.dk)

Dato: **14 JUNI 2011**  
Enhed: Sygehuspolitik  
Sagsbeh.: SUMMNI  
Sags nr.: 1105934  
Dok nr.: 553455

Folketingets Sundhedsudvalg har den 25. maj 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 757 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 757:

"På baggrund af artiklerne om, at flere midtjyder overlever en blodprop bedes ministeren oplyse, hvilke retningslinjer der er, når en patient kommer ind på det pågældende sygehus med tydelige tegn på apopleksi i forhold til CT og MR samt trombolyselbehandling. Ministeren bedes endvidere oplyse om der er forskel på behandlingen af en patient på 40 år og en på 80 år."

Svar:

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som har oplyst følgende:

"Sundhedsstyrelsen kan oplyse at Dansk Neurologisk Selskab efter opfordring fra Sundhedsstyrelsen i 2009 udarbejdede reviderede nationale kliniske retningslinjer for intravenøs trombolyselbehandling ved akut iskæmisk apopleksi.

En sundhedsfaglig arbejdsgruppe udarbejdede derudover kliniske retningslinjer for varetagelse af teletrombolysel. De kliniske retningslinjer er at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under:  
[http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Krav\\_anbefalinger\\_og\\_godkendelser/Neurologi/Trombolyselbehandling.aspx](http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Krav_anbefalinger_og_godkendelser/Neurologi/Trombolyselbehandling.aspx)

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at nationale kliniske retningslinjer gælder i hele landet. Retningslinjerne for trombolyselbehandling beskriver indikationer og kontraindikationer for behandlingen. Ifølge de nationale kliniske retningslinjer er såvel CT som MR anvendelig i den akutte diagnostik før trombolysel. Sundhedsstyrelsen kan endvidere oplyse, at stillingtagen til behandling ikke alene må bero på en patients kronologiske alder. Imidlertid kan der være situationer, hvor en patient qua sin alder og deraf følgende fysiske tilstand ikke vil kunne tåle samme behandling som en yngre patient. I retningslinjerne lægges der således op til, at der skal tages stilling til behandling ud fra en klinisk vurdering af bl.a. patientens biologiske alder."

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder /

Mia Francis Nielsen