



Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [im@im.dk](mailto:im@im.dk)  
W [www.im.dk](http://www.im.dk)

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 30. juni 2011  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: SUMSMJ  
Sags nr.: 1106988  
Dok nr.: 569233

Folketingets Sundhedsudvalg har den 14. juni 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 831 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 831:

" Kan ministeren oplyse

- hvor mange spiseforstyrrede, der er i ambulante behandling i de enkelte regioner fordelt på alder og køn?
- hvor mange der har en dobbelt diagnose, hvoraf den ene er spiseforstyrrelse?
- hvor lange er behandlingsforløb i gennemsnit for en spiseforstyret, fordelt på ambulante og indlagte?
- hvor mange dødsfald der er i Danmark pga. spiseforstyrrelser eller hvor spiseforstyrrelser er en medårsag? Og
- hvor mange genindlæggelser, der er for spiseforstyrrede? "

Svar:

Angående spørgsmål a, skal det bemærkes, at det ikke har været muligt at opgøre antallet af spiseforstyrrede, der er i ambulante behandling i de enkelte regioner fordelt på køn og alder i en samlet tabel, idet antallet af observationer indenfor grupperne er begrænsede. Det har med andre ord ikke været muligt at udarbejde en samlet tabel indeholdende alle tre kategorier.

Tabeller 1-3 nedenfor viser antallet af personer i ambulante behandling for spiseforstyrrelse, opgjort på henholdsvis køn, alder og pr. region. Datamaterialet er desuden opdelt på personer, behandlet i det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen.

**Tabell 1 - Antal personer med spiseforstyrrelse i ambulante behandling i 2010 fordelt på køn**

Køn	Somatik		Psykiatri	
	ambulante besøg	antal personer	ambulante besøg	antal personer
Mænd	396	86	1.169	67
Kvinder	2.578	484	14.331	819

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010

Afgrænset på diagnosekodeme 'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

Tabell 1 viser fordelingen af kvinder og mænd i ambulante behandling for spiseforstyrrelse. Det fremgår af tabellen, at 1.303 kvinder og 153 mænd blev ambulante behandlet for spiseforstyrrelse i 2010. Næsten 90 pct. af de patienter, som behandles ambulante for spiseforstyrrelse i det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen er således kvinder.

Aldersgruppe	Somatik		Psykiatri	
	ambulante besøg	antal personer	ambulante besøg	antal personer
0-18 år	1.048	241	2.606	160
19-40 år	1.575	267	11.052	616
41-60 år	270	48	1.730	100
61- år	81	14	112	10

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010  
 Afgrænset på diagnosekodeme 'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

Ovenstående tabel 2 viser antallet af personer i ambulat behandling fordelt i aldersgrupper. Antallet af patienter, som behandles ambulat for en spiseforstyrrelse, falder med patientens alder. Antallet af patienter over 40 år i ambulat behandling for spiseforstyrrelse svarer således til 12 pct. af patienterne.

Region	Somatik		Psykiatri	
	ambulante besøg	antal personer	ambulante besøg	antal personer
Nordjylland	36	11	1.227	74
Midtjylland	236	73	3.115	186
Syddanmark	1.513	246	3.067	200
Hovedstaden	892	168	5.078	313
Sjælland	297	78	3.013	126

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010  
 Afgrænset på diagnosekodeme 'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

*Bemærk: Antal personer summer ikke, når regionsopdelingen sammenlignes med opdeling på køn og alder. Dette skyldes at bopælsregionen har opgjort på behandlingstidspunktet, og at patienten kan være flyttet fra én region til en anden imellem to behandlinger.*

Af tabel 3 fremgår antallet af personer med spiseforstyrrelse i ambulat behandling fordelt på regioner. Tallene viser, at Region Nordjylland har den højeste andel af patienter med spiseforstyrrelse, som behandles ambulat i psykiatrien frem for somatikken, svarende til 97 pct. af patienterne i regionen. Region Syddanmark har derimod den laveste andel, svarende til, at 67 pct. af patienterne behandles ambulat i psykiatrien frem for i somatikken.

Angående spørgsmål b om, hvor mange der har en dobbeltdiagnose, hvoraf den ene er spiseforstyrrelse, skal det oplyses, at tallene i nedenstående tabel 4 er opgjort på baggrund af registreringerne i Landspatientregistret (LPR). Det bemærkes, at samme person kan optræde flere gange, idet de diagnoser, der relaterer sig til indlæggelsen, er registreret på hver enkelt indlæggelse/ ambulat besøg. Samme person kan derfor f.eks. være indlagt to gange i løbet af et år, hvor der er registreret én diagnose på første indlæggelse og to på anden indlæggelse.

**Tabel 4 Antal personer registreret med en eller flere diagnoser ud over diagnosen spiseforstyrrelse i 2010**

	Somatik	Psykiatri
	--- antal personer ---	
Ambulant	267	483
Stationær	287	127

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010  
 \*Diagnosekoder vedr. spiseforstyrrelse:  
 'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

Antallet af personer registreret med én eller flere diagnoser udover diagnosen spiseforstyrrelse, som blev behandlet på somatisk og psykiatrisk sygehusafdeling fremgår af ovenstående tabel 4. Det fremgår af tabellen, at 267 personer med én eller flere diagnoser ud over spiseforstyrrelse blev behandlet ambulant i somatikken mod 483 i psykiatrien. Tilsvarende blev 287 personer med én eller flere diagnoser udover spiseforstyrrelse behandlet under indlæggelse i somatikken mod 127 i psykiatrien. Det svarer til, at der i 2010 i alt var registreret 1.164 personer med en eller flere diagnoser udover diagnosen spiseforstyrrelse. Til sammenligning kan det oplyses, at der på samme tid var registreret 1.046 personer med diagnosen spiseforstyrrelse, som eneste diagnose.

Angående spørgsmål c om hvor langt et behandlingsforløb i gennemsnit er for personer med spiseforstyrrelse fordelt på ambulant og indlagt, skal det indledningsvist oplyses, at behandlingsforløb for personer med en spiseforstyrrelse varierer betydeligt i indhold og varighed, afhængig af bl.a. sygdommens diagnose og sværhedsgrad, og hvorvidt personen har andre samtidige sygdomme såkaldt comorbiditet. Indlæggelsestiden kan f.eks. variere fra 2-4 dage op til 1 års varighed. Det bemærkes i øvrigt, at et behandlingsforløb ikke er lig med en indlæggelse. Et behandlingsforløb kan omfatte flere indlæggelser samt ambulante behandlinger.

**Tabel 5 – Oversigt over somatiske og psykiatriske ambulante besøg og antal personer i 2010**

	Ambulante besøg	Personer
	--- antal ---	
Somatik Ambulant	2.974	570
Psykiatri Ambulant	15.500	886

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010  
 Afgrænset på diagnosekoderne  
 'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

Antallet af ambulante besøg på somatisk og psykiatrisk sygehusafdeling og antallet af personer, som modtog ambulant behandling fremgår af ovenstående tabel 5. Af tabel 5 fremgår, at 570 personer havde 2.974 ambulante besøg i somatikken og 886 personer havde 15.500 ambulante besøg i psykiatrien. Det svarer til, at det gennemsnitlige antal ambulante besøg i det psykiatriske sygehusvæsen er 17,5 og i det somatiske sygehusvæsen 5,2 besøg for personer med spiseforstyrrelse.

**Tabel 6 – Oversigt over somatiske og psykiatriske indlæggelser og antal personer i 2010**

	Indlæggelser	Personer	Sengedage
	--- antal ---		
Somatik Stationær	615	406	3.877
Psykiatri Stationær	397	224	14.379

Kilde: LPR pr. 10. marts 2011, aktivitetsår 2010, Takstsystem 2010  
Afgrenset på diagnosekoderne  
'DF50', 'DF500', 'DF501', 'DF502', 'DF503', 'DF504', 'DF505', 'DF508', 'DF509'

Ovenstående tabel 6 viser antallet af somatiske og psykiatriske indlæggelser, sengedage og antallet af indlagte personer i 2010. Det fremgår af tabellen, at 406 personer havde 615 indlæggelser og 3.877 sengedage i somatikken og 224 personer havde 397 indlæggelser og 14.379 sengedage i psykiatrien. Det svarer til, at personer med spiseforstyrrelse i gennemsnit er indlagt 36,2 dage i psykiatrien og 6,3 dage på en somatisk sygehusafdeling.

Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen bidrage til besvarelse af spørgsmål d om hvor mange dødsfald, der er i Danmark på grund af en spiseforstyrrelse, eller hvor spiseforstyrrelse er medårsag. Det skal indledningsvist oplyses, at Dødsårsagsregistret, hvorfra nedenstående tal kommer fra, er opdateret til og med 2009.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at der i perioden 2002 til 2009 i alt er registreret 35 dødsfald på landsplan, som følge af spiseforstyrrelse, hvilket svarer til et gennemsnitligt antal dødsfald på ca. 4 personer om året.

Antallet af tilfælde, hvor spiseforstyrrelser er nævnt på dødsattesten udgør 78 personer i samme periode fra 2002 til 2009. I de fleste af disse tilfælde kan det imidlertid ikke med sikkerhed konkluderes, at spiseforstyrrelser er medvirkende årsag.

Endelig vurderer Sundhedsstyrelsen, at antallet af dødsfald, hvor spiseforstyrrelse er medvirkende årsag, skønnes at være 1-2 dødsfald årligt, afhængigt af definitionen på begrebet "medårsag".

Angående spørgsmål e om hvor mange genindlæggelser, der er for personer med spiseforstyrrelse, kan det oplyses, at 84 personer med en spiseforstyrrelsesdiagnose tilsammen blev genindlagt 194 gange i det somatiske sygehusvæsen i 2010.

Genindlæggelse defineres som uspecifikke, akutte genindlæggelser inden for 30 dage fra udskrivning. Det bemærkes, at der ikke skelnes imellem, om en patient genindlægges på sygehus med samme sygdom (diagnose) eller en anden sygdom, i forhold til den vedkommende blev udskrevet med.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Sine Mutanu Jungersted