



Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [im@im.dk](mailto:im@im.dk)  
W [www.im.dk](http://www.im.dk)

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 8. juli 2011  
Enhed: Sygehuspolitik  
Sagsbeh.: SUMCSH  
Sags nr.: 1107648  
Dok nr.: 576695

Folketingets Sundhedsudvalg har den 30. juni 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 869 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).

Spørgsmål nr. 869:

"Ministeren bedes oplyse effekten af kræftpakkerne for patienter med kræft i tyk- og endetarm i forhold til hvor mange dage der går fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder med tal for første halvår 2008 og seneste opgørelse, og oplyse ændringen i antal dage i procent fra første halvår 2008 til seneste opgørelse."

Svar:

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner offentliggør halvårligt publikationen "Monitorering af kræftområdet", som kan findes på såvel Sundhedsstyrelsens som Danske Regioners hjemmeside. Af publikationen fremgår bl.a. udviklingen i tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder (forløbstid).

Denne tidsindikator fastlægges på baggrund af en antagelsesbaseret model, hvilket betyder, at Sundhedsstyrelsen i publikationen udtrykkeligt anfører, at resultaterne bør tolkes som *tendenser* i udviklingen over tid. Man skal derfor være varsom med at sammenligne to enkelte perioder på den måde, som spørgeren ønsker.

Under alle omstændigheder kan udviklingen i forløbstiden fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2010 kun i begrænset omfang tages som udtryk for effekten af indførelsen af pakkeforløb for patienter med tyk- og endetarmskræft. Dette skyldes, at den store bevågenhed på kræftbehandling og forløbstider i 2006 betød, at regionerne allerede i 2007 begyndte at arbejde med organiseringen af udrednings- og behandlingsforløbene på kræftområdet, hvorfor de første effekter af pakkeforløbene reelt indtraf før den formelle implementering i løbet af 2008. Dette gælder ikke mindst for kræft i tyk- og endetarm, som var blandt de kræftformer, hvor pakkeforløbet skulle være implementeret allerede pr. 1. april 2008.

Et mere reelt udtryk for effekten af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft fås derfor ved at se på udviklingen i forløbstiden siden 1. halvår 2007. Den nævnte publikation fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner vil ved den næste offentliggørelse blive udvidet til også at omfatte årene før 2008.

Udviklingen i forløbstiden i perioden fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2010 fremgår af nedenstående tabel.

**Udvikling i den mediane forløbstid for patienter med tyk- og endetarmskræft**

	1. halvår 2007	2. halvår 2007	1. halvår 2008	2. halvår 2008	1. halvår 2009	2. halvår 2009	1. halvår 2010
Dage	36	34	27	28	29	29	29
%-ændring ift. 1. halvår 07		-6 %	-25 %	-22 %	-19 %	-19 %	-19 %

Af tabellen fremgår det, at der fra 2007 til 2008 skete et markant fald i forløbstiden. Fra 2008 og frem har forløbstiden stabiliseret sig på det nye lavere niveau dog efter en lille stigning fra 2008 til 2009, således at forløbstiden er steget med ca. 7 pct. fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2010.

Det overordnede billede er dog, at arbejdet med pakkeforløbet for patienter med tyk- og endetarmskræft har medført et betydeligt fald i forløbstiden for patienterne.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Christian Skov Hansen