


FORBUD MOD DYRESEX

- Konsekvenser & Skader
Påført Dyrene -

V. DYRLÆGE MICHALA BANDIER



DET KAN IKKE VENTE

Erfaring er det navn, enhver giver sine fejltagelser

Oscar Wilde

Ikke at forstå er slemt, ikke prøve at forstå er værre

Nigeriansk ordsprog

BAGGRUND

- Er der i gældende lovgivning taget højde for situationer, hvor dyret lider overlast?
- § 1 i Dyreværnsloven lyder: "Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe"
- Loven bruges ikke i tilstrækkeligt omfang
- Det kan være endog meget svært flere dage efter gerningstidspunktet at påvise, at et dyr har været udsat for angst, smerte eller væsentlig ulempe i forbindelse med seksuelle aktiviteter

FACTS

- Betydeligt flere mænd end kvinder har seksuel omgang med dyr
- Vaginalt samleje er en af de oftest forekommende aktiviteter
- Heste og hunde er de dyrearter, der oftest indgår i de seksuelle aktiviteter
- Et større litteraturstudium af Betz & Podberscek i 2005 "Bestiality and Zoophilia" viser klare tegn på sammenhæng mellem vold mod mennesker og alle former for seksuel omgang med dyr
- Seksuel omgang med dyr ses hyppigere hos voldelige personer

TO SKADESTYPER

- Alvorlige skader, fx perforation af skedevæggen og efterfølgende bughindebetændelse ved indførelse af skarpe eller spidse genstande
 - dyret vil blive alvorligt sygt og måske dø
- Mindre omfattende skader i vaginas slimhinde
 - kan måske forblive uopdaget, men det er på ingen måde ensbetydende med, at den seksuelle aktivitet ikke har været forbundet med smerte, angst eller væsentlig ulempe

HUNDYRENE KØNSCYKLUS

- Hunhunde er i løbetid/brunst gennemsnitligt hver 7. måned og brunsten varer 3 uger
 - De første 7-10 dage: forbrunst (bløder fra vagina og afviser hanhunde)
 - De sidste 2-3 dage: brunsten under afvikling, og hunhunden vil også her afvise hanhunde
 - De midterste 9-11 dage: villig til parring og fysisk klar
- Hunhunde er gennemsnitlig parringsvillige og parringsklar i mindre end 20 dage om året og "delvis" klar i en tilsvarende periode

NÅR HUNDYRET IKKE ER FYSIOLOGISK KLAR TIL PARRING

- Vaginalslimhinden befinder sig i en slags dvaletilstand
 - skrøbelig og let beskadigelig
- Indføring af en mands erigerede penis eller fysiske genstande, efterfulgt af parringsbevægelser vil give rifter og sår i slimhinden, også selv om der udvises passende forsigtighed, tålmodighed og bruges tilstrækkelig glidecreme
- Det er urealistisk at tro, at seksuelt ophidsede personer husker eller overhovedet tænker på at være forsigtige og tålmodige

KONSEKVENSER AF VAGINALSKADER

- En del sår og rifter vil hele op i løbet af en uges tid og vil derefter være svære at påvise
 - vil som minimum være forbundet med væsentlig ulempe (jvf. Dyreværnsloven § 1)
- En del sår vil der gå betændelse i
 - medfører større ubehag og smerte i en grad, som er afhængig af hvor udbredt og dybtgående betændelsen bliver
 - i vises tilfælde vil der ved dybe sår og/eller dybtgående betændelse ske perforation af vagina, således at hundyret får bughulebetændelse og dør

ANDRE HENSYN OG RISICI

- Vi har ansvaret for respekten for dyrene i vores varetægt, deres værdighed og integritet
- Seksuelt overførte sygdomme
 - Herpes, kondylomer, gonorré, HIV?
- Dyr har ikke, modsat mennesker, muligheden for at foretage en risikovurdering og træffe valg på baggrund af denne

ET SPØRGSMÅL OM VÆSENTLIG RISIKO

- Tør vi overlade ansvaret til zoofile og bestialister for, at drage omsorg for, at dyrene ikke lider overlast, når de seksuelt ophidset giver sig i kast med disse aktiviteter?
- NEJ - der er for stor fare for, at aktiviteten ender med, at dyret lider overlast og udsættes for væsentlig ulempe, angst eller smerte.

DET KAN IKKE VENTE - DERFOR MÅ DER HANDLES NU -

- Skub ikke ansvaret videre til næstemanden
- Giv de personer der har kompetencen til at handle juridisk hjemmel til at håndtere sager om dyresex (sodomi)
- Det ultimative mål må være at forebygge frem for at behandle allerede opstået skade