



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 21. februar 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMNMO
Sags nr.: 1201275
Dok nr.: 826442

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. januar 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 255 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Løhde (V).

Spørgsmål nr. 255:

"Ministeren bedes oplyse, hvorvidt de nyeste forbrugstal fra 2011 viser en ændring af forbruget af de lægemidler, der anvendes i behandlingen af stærke smerter, hvis man sammenligner med perioden 2006-2010."

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen oplyser følgende:

"Lægemidler til behandling af stærke smerter omfatter opioider, fx morphin, oxycodon og tramadol, samt methadon og codein.

Det samlede forbrug af lægemidler til behandling af stærke smerter steg med 6 % fra 2006 til 2011. Stigningen var ikke helt jævn, idet der var en større stigning på knap 3 procent fra 2007 til 2008, efterfulgt af et mindre fald fra 2008 til 2009. Herefter er forbruget igen steget svagt. Fra 2010 til 2011 var stigningen på 1 procent. Udviklingen i forbruget kan ses i figur 1 og tabel 1 nedenfor.

Det samlede antal brugere af lægemidler til behandling af stærke smerter steg med 18 procent fra 2006 til 2011. Der var især en stigning i antal brugere fra 2009 til 2010 og igen fra 2010 til 2011, hvor antallet af brugere steg med 6 procent per år. Der skal ved fortolkningen af disse tal tages højde for, at befolkningstilvæksten var på knap 1 procent fra 2009 til 2011, samtidig med at alderssammensætningen har ændret sig, så der nu er flere personer i de ældre aldersgrupper. Udviklingen i antallet af brugere kan ses i tabel 2 nedenfor.


Både stigningen i det samlede forbrug og i det samlede antal brugere dækker over store forskelle mellem de enkelte lægemidler, hvor forbruget af morphin, tramadol og codein er steget, mens forbruget af oxycodon er faldet. Forbruget af de øvrige stærke smertestillende lægemidler er enten uændret eller faldet en smule. Antallet af brugere følger i store træk samme mønster som forbruget.

Vores analyse er baseret på oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister om salget af stærke smertestillende lægemidler til enkeltpersoner i den primære sundhedssektor for perioden 2006 – 2011.

Forbruget måles i definerede døgndoser (DDD), som er baseret på den gennemsnitlige døgndosis som en voksen bruger, hvis vedkommende behandles for den sygdom, lægemidlet primært er markedsført til. DDD sættes herefter i forhold til antallet af potentielle brugere (befolkningen i Danmark det pågældende år). Måleenheden bliver da DDD per 1.000 indbyggere per døgn.

En person tæller med i statistikken, hvis vedkommende har indløst mindst en recept på lægemidlet i løbet af året. Antallet af brugere af de forskellige stærke smertestillende lægemidler kan ikke lægges sammen, da en bruger kan have indløst recept på flere forskellige lægemidler i løbet af året.

Figur 1. Forbruget af morphin, oxycodon, tramadol og codein, samt øvrige stærke smertestillende midler, målt i DDD per 1.000 indbyggere per døgn, 2006 – 2011



Tabel 1. Forbruget af stærke smertestillende midler, målt i DDD per 1.000 indbyggere per døgn, 2006 – 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Morphin	1,86	1,77	1,77	1,66	1,88	2,30
Hydromorphon	0,02	0,05	0,06	0,06	0,05	0,04
Nicomorphin	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03
Oxycodon	1,79	2,07	2,27	2,38	2,36	2,01
Oxycodon, komb.				0,01	0,02	0,03
Codein, komb.	2,76	2,76	2,74	2,66	2,73	2,55
Pethidin	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05
Fentanyl	1,49	1,56	1,65	1,68	1,67	1,58
Buprenorphin	0,66	0,70	0,74	0,76	0,77	0,74

Ketobemidon, komb.	1,19	1,11	1,00	0,86	0,71	0,64
Tramadol	7,65	7,98	8,21	8,27	8,66	9,08
Tapentadol						0,03
Methadon	2,30	2,30	2,41	2,43	2,46	2,42
Codein	3,51	3,49	3,31	3,18	3,27	3,36
Total	23,38	23,93	24,29	24,06	24,68	24,87

Tabel 2. Antal brugere af stærke smertestillende midler, 2006 – 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Morphin	29.856	29.287	29.357	31.172	46.818	67.812
Hydromorphon	188	698	495	335	295	219
Nicomorphin	4.167	3.902	2.984	2.815	3.074	2.306
Oxycodon	45.308	54.915	62.187	69.315	69.945	49.302
Oxycodon, komb.				495	667	988
Codein, komb.	62.440	58.289	55.514	51.633	50.532	45.067
Pethidin	4.053	3.800	3.530	3.101	3.085	2.648
Fentanyl	15.619	17.051	17.564	18.152	18.215	17.480
Buprenorfin	17.114	19.629	22.172	23.880	23.006	22.496
Ketobemidon, komb.	28.682	26.141	23.414	20.730	18.752	17.627
Tramadol	235.387	242.869	246.387	253.603	269.636	283.369
Tapentadol						1.463
Methadon	7.405	7.500	7.915	8.030	8.283	8.595
Codein	100.415	105.663	93.692	94.624	105.821	132.495
Total*	432.603	447.405	442.611	452.096	479.203	510.086

”

Jeg henholder mig til oplysningerne fra Lægemiddelstyrelsen.

Medicintilskudsnettets indstilling om fremtidig tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler er i øjeblikket i bred høring med høringsfrist den 3. april 2012.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr / Nina Moss