



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 17. november 2011
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMCSH
Sags nr.: 1111683
Dok nr.: 710680

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. oktober 2011 stillet følgende spørgsmål nr. SUU 39 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. SUU 39:

"Kan ministeren afvise, at trykkammerbehandling kan vække slumrende kræftceller til live? Ministeren bedes endvidere oplyse hvilke undersøgelser en patient bør gennemgå såfremt denne gennemgår behandling i trykkammer. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2010-2011, jf. SUU alm. del – spm. 909."

Svar:

For at besvare spørgsmålet har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om et bidrag. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende:

"Sundhedsstyrelsen har fastsat elektiv hyperbar iltbehandling dvs. trykkammerbehandling som højt specialiseret behandling ved hhv. Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital.

I henhold til det for Sundhedsstyrelsen oplyste, foreligger der et begrænset antal videnskabelige undersøgelser, der belyser spørgsmålet og der er heri ikke belæg for, at slumrende kræftceller skulle vækkes til live ved trykkammerbehandling.

Det foreligger endvidere oplyst overfor styrelsen, at patienter der er henvist til trykkammerbehandling forinden vurderes af læge med særlig uddannelse på området. Det foretages i den forbindelse en gennemgang af tidligere sygdomshistorie samt en objektiv undersøgelse herunder vedr. blodtryk og hjertefunktion. Eventuelle yderligere og supplerende undersøgelser foretages på baggrund af den enkelte patients sygdomsproblematik. Det kan f.eks. dreje sig om lungefunktionsundersøgelse eller PET-skanning.

For så vidt angår henviste med tidligere malign sygdom, dvs. patienter henvist til behandling for sene stråleskader konfereres patienten altid med senest behandelende onkologisk afdeling. Patientgruppen med følger efter hoved- hals- cancer udgør en kernergruppe af patienter og det vides at denne patientgruppe er en højrisikogruppe for flere og nyopståede cancere i området. Der udvises særlig opmærksomhed i relation hertil.

I nogle tilfælde kan det forekomme at trykkammerbehandling ydes som palliativ behandling til en patient med en aktiv cancersygdom."

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Christian Skov Hansen