



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 31. maj 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMBBM
Sags nr.: 1206263
Dok nr.: 935940

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 2. maj 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 524 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA).

Spørgsmål nr. 524:

"Kan ministeren bekræfte, at afhængigheden af nikotinbaserede rygestopmidler er særdeles omfattende i Danmark og svarer til tal fra Kræftens Bekæmpelse ("Monitorering af danskernes rygevaner, 2010"), som angiver, at over 60 pct. af de danskere der anvender nikotinbaserede rygestopmidler, har brugt dem i mere end 1 år?"

Svar:

Til brug for min besvarelse har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om en udtalelse. Sundhedsstyrelsen har oplyst mig om, at 60 % af de danskere, der anvendte nikotinbaserede rygestopmidler (NRT), ifølge Monitorering af danskernes rygevaner 2010, havde brugt dem mere end et år. Dette tal er ifølge Monitorering af danskernes rygevaner 2011 faldet til 41 %. Nikotinbaserede rygestopmidler anvendes typisk i forbindelse med rygestop eller ved reduktion i tobaksforbrug.

Ifølge Monitorering af danskernes rygevaner fra 2011 angiver knap en 1/5-del af de danskere, der anvender nikotinbaserede rygestopmidler, at de føler sig afhængige af disse. Det skal dog understreges, at nikotinafhængigheden er opstået som følge af et tobaksforbrug og ikke på grund af nikotinbaserede rygestopprodukter.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Brit Borum Madsen