



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 31. maj 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSMJ
Sags nr.: 1205761
Dok nr.: 932404

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 3. maj 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 540 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 540:

"Ministeren bedes oplyse, hvor mange årlige dødsfald i Danmark, der kan henføres til henholdsvis rygning, alkohol, overvægt, selvmord, narkotika, biluheld og mord."

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse af spørgsmålet anmodet Statens Serum Institut, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, om et bidrag.

Statens Serum Institut har oplyst, at nedenstående opgørelser er baseret på Dødsårsagsregisteret. I Statens Serum Instituts statistik over dødsårsager indgår den tilgrundliggende dødsårsag, som er registreret på dødsattesten. Den tilgrundliggende dødsårsag er den sygdom eller tilstand, der starter forløbet, som afsluttes af den umiddelbare dødsårsag. Som eksempel kan nævnes, at en person med prostatakræft, som dør af lungebetændelse, vil prostatakræft blive registreret som den tilgrundliggende dødsårsag, mens lungebetændelsen registreres som den umiddelbare dødsårsag.

Nedenfor følger opgørelser over dødsfald, hvor den tilgrundliggende dødsårsag er henholdsvis alkohol, selvmord, narkotika, biluheld og mord.

ALKOHOL

Antal dødsfald, hvor alkohol er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag, 2002-2010.								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.410	1.385	1.561	1.560	1.689	1.734	1.847	1.729	1.673

Kilde: Dødsårsagsregisteret.

Anm.: Opgørelsen er baseret på den tilgrundliggende dødsårsag afgrænset efter ICD-10 koderne X45, X65, Y15, F10, K70, K852, K86.0, K29.2, G31.2, G62.1, I42.6, Q86.0 og E24.4.

Det bemærkes, at idet der er tale om den tilgrundliggende dødsårsag, indgår alkoholrelaterede dødsfald ikke i opgørelsen (f.eks. dødsfald som følge af ulykker mv., hvor alkohol er involveret).

SELVMORD

Antal dødsfald, hvor selvmord er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag, 2002-2010.								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
688	631	660	631	647	592	615	639	587

Kilde: Dødsårsagsregisteret.

Anm.: Opgørelsen er baseret på den tilgrundliggende dødsårsag afgrænset efter ICD-10 koderne X60-64 og Y870.

NARKOTIKA

Narkotikarelaterede dødsfald, 2005-2010								
2002	2003	2004	2005	2006	2007*	2008*	2009*	2010*
-	-	-	208	227	211	211	222	204

Kilde: Dødsårsagsregisteret

Anm Opgørelsen over narkotikarelateret dødsfald er afgrænset på de ICD-10 koder, der er fastlagt af Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).

*Tallene for 2007, 2008, 2009 og 2010 er forhøjet med hhv. 2,4 pct. og 2,8 pct. og 3,4 pct. og 4,5 pct. i forhold til det indberettede antal dødsattester for at kunne sammenligne med tidligere år. Disse forhøjelser er foretaget for at kompensere for, at Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget alle dødsattester for de pågældende år. Beregningerne er foretaget ved sammenligning med indberetninger til CPR-registeret.

Det bemærkes, at data for perioden 2002-2004 ikke er manuelt bearbejdet hos Sundhedsstyrelsen. Der er i disse årgange en underrepræsentation af narkotikadødsfald og dødsfald som følge af forgiftninger, hvorfor antallet af narkotikarelateret dødsfald baseret på Dødsårsagsregisteret ikke er opgjort for perioden 2002-2004.

BILUHELD

Antal dødsfald, hvor biluheld er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag, 2002-2010.								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
378	374	301	294	270	312	336	263	231

Kilde: Dødsårsagsregisteret.

Antallet af dødsfald som følge af "biluheld" er i nærværende opgørelse afgrænset til at omfatte uheld med biler, varevogn, lastvogne, busser, landbrugskøretøj samt industrikøretøj. Opgørelsen er baseret på den tilgrundliggende dødsårsag afgrænset efter ICD-10 koderne V03-V04, V13-V14, V23-V24, V33-V34, V40-V49, V50-V59, V60-V69, V70-V79, V83-V84 og V899.

MORD

Antal dødsfald, hvor mord er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag, 2002-2010.								
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
49	61	35	55	36	48	46	46	42

Kilde: Dødsårsagsregisteret.

Anm.: Opgørelsen er baseret på den tilgrundliggende dødsårsag afgrænset efter ICD-10 koderne X85-99, Y00-09 og Y8710.

Statens Serum Institut har endvidere oplyst, at det ikke er muligt ud fra dødsattesten at afgøre, om et dødsfald direkte skyldes rygning eller overvægt, dvs. om rygning eller overvægt er den tilgrundliggende dødsårsag. Der kan derfor

ikke, på baggrund af Dødsårsagsregisteret, opgøres antal dødsfald, hvor rygning og overvægt er den tilgrundliggende dødsårsag.

Det kan dog oplyses, at bl.a. Statens Institut for Folkesundhed har estimeret dødsfald relateret til rygning og overvægt. Ifølge undersøgelsen *Sundhed og sygelighed i Danmark 2010*, som udgives af Statens Institut for Folkesundhed er der totalt set 13.900 årlige dødsfald relateret til rygning i Danmark. Det svarer til ca. 25 pct. af alle dødsfald. Det anslås endvidere i undersøgelsen, at der hvert år dør mellem 1.300 og 1.400 danskere på grund af overvægt, svarende til ca. 2 pct. af alle dødsfald.

På baggrund af ovenstående opgørelse kan det således konkluderes, at livsstilsrelaterede dødsfald som følge af alkohol, rygning og overvægt fylder væsentligt i statistikken over dødsfald i Danmark, når der sammenlignes med dødsfald som følge af selvmord, biluheld, mord og narkotika.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Sine Mutanu Jungersted