



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 18. juni 2012  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: DEPCHO  
Sags nr.: 1206412  
Dok nr.: 955034

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 22. maj 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 604 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 604:

”Hvordan er udviklingen i forhold til behandling med buprenorfin som Subutex og suboxone, i forhold til Metadon?”

Svar:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fra Sundhedsstyrelsen indhentet følgende bidrag, hvortil jeg kan henholde mig:

”På baggrund af data fra SIB (Statens Serum Instituts Register over stofmisbrugere i behandling) for perioden 2007 til 2010 kan Sundhedsstyrelsen oplyse, at der i 2010 var knap 14.600 personer registeret i stofmisbrugsbehandling, heraf omkring 7.400 personer i substitutionsbehandling med enten metadon eller buprenorfin. Andelen af personer i metadonbehandling er på 83 pct. mod 17 pct. i buprenorfin behandling i 2010. Siden 2007 er andelen af personer i metadonbehandling faldet svagt og har været uforandret fra 2009 til 2010.

Mønstret ser dog markant anderledes ud, hvis man udelukkende ser på de personer, der er startet som nye i behandling. I 2010 er der 56 pct. i metadonbehandling mod 44 pct. i buprenorfinbehandling. Dette forhold har ligeledes ikke ændret sig fra 2009 til 2010.”

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Christina Henriette Holton