



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
udvalg@ft.dk

Dato: 5. oktober 2012
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMCALC
Sags nr.: 1208630
Dok nr.: 1027391

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 15. august 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 795 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 795:

"Er ministeren enig med Osteoporoseforeningen i, at der er behov for at få udarbejdet en national handlingsplan og kan ministeren bekræfte, at 550.000 danskere har knogleskørhed?"

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende:

"Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at osteoporose overordnet defineres af WHO, når der ved undersøgelse af patienten forekommer en T-score på under -2,5, dvs. mere end 2,5 standarddeviationer under middelværdien for knoglemineralindhold.

Omsat til danske forhold skønnes det, at 41 % af danske kvinder over 50 år har en T-score under -2,5 svarende til 388.000 kvinder, og at 18 % af danske mænd over 50 år har en T-score under -2,5, svarende til 145.000 mænd. Det vil sige, at i alt ca. 530.000 personer skønnes at have en T-score under -2,5 og dermed muligvis osteoporose (kilde: Medicinsk Kompendium, 2009).

Jf. Sundhedsstyrelsens bidrag til svar på SUU spm. 794 oplyser 3,2 % af befolkningen i den Nationale Sundhedsprofil fra 2010 at leve med osteoporose eller eftervirkninger af tidligere sygdom svarende til 142.000 personer. Dette tal dækker over en kønsvariation i forekomsten på 1,0 % hos mænd og 5,4 % hos kvinder med tiltagende forekomst i de ældre aldersgrupper.

Den Nationale Sundhedsprofils oplysninger er baseret på selvrapporterede oplysninger fra patienter, der har fået stillet diagnosen osteoporose og er i behandling. Idet osteoporose ikke i alle tilfælde er symptomgivende, må det forventes, at der er diskrepans mellem antallet af rapporterede sygdomstilfælde og antallet af personer, der radiologisk har tegn på osteoporose. Det bør også understreges, at ikke alle radiologisk påviste tilfælde af osteoporose er behandlingskrævende. Dette forudsætter, at der er øvrige forhold, der gør sig gældende.

Således anbefales det i Dansk Knoglemedicinsk Selskabs behandlingsvejledning for osteoporose, at følgende patienter behandles:

- Patienter med lavenergifrakstur i proximale femur eller i columna
- Patienter med T-score $\leq -2,5$ og risikofaktor for fraktur
- Meget lav T-score: Personer uden risikofaktor for fraktur der ved en DXA-scanning har fået konstateret en T-score $\leq -4,0$ bør tilbydes behandling. Dette bør dog ikke føre til en generel screening m.h.p. identifikation af individer med en meget lav T-score.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger. I forhold til behovet for en national handlingsplan for osteoporose kan jeg henvise til min besvarelse af SUU spm. 794.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Camilla Lund-Cramer