



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 9. oktober 2012
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMTK
Sags nr.: 1209353
Dok nr.: 1051485

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 3. september 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 864 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Løhde (V).

Spørgsmål nr. 864:

”Ministeren bedes oplyse, i hvilke regioner ambulancepersonalet foretager intubering.”

Svar:

Ministeriet har til brug for min besvarelse af spørgsmålet anmodet Danske Regioner om en udtalelse.

Danske Regioner har oplyst følgende:

”Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden er det kun læger, der foretager endotracheal intubation.

Region Sjælland

I Region Sjælland foretager ambulancepersonalet ikke endotracheal intubation – dvs. de har ikke kompetence til at nedlægge en tube/slange gennem næse eller mund til luftrør nedenfor stemmelæber.

Udvalgte grupper af ambulancepersonalet i Region Sjælland (Paramedicinere) har efter ekstra-uddannelse kompetence til at anlægge ”Larynxmaske” – dvs. at nedlægge tube/slange gennem munden i øvre luftveje til ovenfor stemmelæber.

Region Syddanmark

Ambulancepersonalet intuberer ikke i Region Syddanmark.

Region Midtjylland

I Region Midtjylland intuberer paramedicinere ikke.

Når der er tale om både anæstesi og intubation præhospitalt sker det ved anæstesilæge - dog kan en præhospital anæstesilæge give konkret ordination til en anæstesisygeplejerske om dette, såfremt dette vurderes nødvendigt at gøre før lægens ankomst. I praksis sker det meget sjældent. Anæstesisygeplejerske kan selvstændigt intubere ved hjertestop, hvor der ikke er brug for at give anæstesi forinden.

Region Nordjylland

I Region Nordjylland laves i dag en undersøgelse, hvor paramedicinere intubere patienter genoplivet efter hjertestop. De giver ingen medicin for at intubere, patienterne er bevidstløse og uden reflekser. Undersøgelsen vil ikke blive anvendt efter 31. december 2012.

Fra 1. januar 2013 er alle paramedicinerne i Region Nordjylland "omskolet" og vil i stedet bruge larynxmaske."

Jeg kan henholde mig til Danske Regioners oplysninger.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Tove Kjeldsen