

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del Bilag 248
Offentligt

BILAG 1 - 18 INDBERETTEDE SAGER april 2013

Kodning	Årstal	Hændelse optrådte	Hændelse, uddybning	Indgik	hændelse i tid efter sidste dosis	Indberettet af læge som blivning
1	2003	Placentalavring Blødning 3000 ml	Voldsom blødning i hjemmet, hyperakut sectio med fæt barn. Menopausal placenta: var ud til at det er laparotomi, der har været og 15x15 cm). Aloni. Samlet blødning 3000 ml	50 sug x 1	2 timer efter- rigelig blødning	Nej
2	2003	Uterusruptur på varmt uterus	2 para. Uterusruptur på ikke tidligere arret uterus. Rupturen går fra region af fundus til recto-vaginat	50 sug x 1	?	Nej
3	2003	Hyperton uterus. Medfødt akut sectio, ægget 3/1	1 para. Væder tilbage i afdeling pga "mindre" CTG. Ruptur var ikke mærket. Ansigtsvædet område: placentalområde, hyperton uterus. Akut sectio, lykt melkumtilblødet forlovede. Ægget 3/1	50 sug x 1	?	Nej
4	2000-09	Vestorm i hjemmet, føvsted	Vestorm i hjemmet. Beskrives pr telefon som veer uden pauser. Ved ankomst til hospital ingen hjerteblok. Uterine smerter ved palpation, men ingen hyperstimulation, ingen barn på kejsersnit	25 sug x 1	10 timer - barn dødt	Nej
5	2003	Ruptur varmt uterus. Afdeling barn - i dag frak	Ruptur på ikke tidligere arret uterus. Efter vandgang på dg 2 oprettes 5-drops. Skruer til 180 mg/h. Bliver 1 cm åben får meget smert. I nedre del af abdomen. På et ukendt tidspunkt begynder pr blod at koagulere. Man mener fosterfortrydning sker på akut sectio. Pludselig rumperer uterus og veerne stopper. Forløbet af et levende barn ægget 3/1, 4/1, 6/1 og 8/10. Kommer 2 dage i kuvas. Uterus synes sammen foran, bagå og hele vejen med gennem collum	25 sug x 2 - en pr dag		Nej - ikke i første omgang. Måske efter meddelelse
6	2003	Ruptur arret uterus. Afdeling barn - i dag måske rask	2 gang tidligere med tidligere sectio (gangættelse). På et ukendt tidspunkt opleves uterusruptur og der fortages akut sectio. Barn med ph 6.77	50 sug x 2 - 1 gang dagligt		Nej
7	2006	Voldsomt forløb Blødning 1900 ml	5 timer efter opløst af stikpille - pludselig voldsomme veer. 1 time senere skingende pga smerter, øjeblik og aflerig kontraktioner. Fryer - ryser. Ikke koagulering. Kan ikke presse ved udslidst pga smerter og manglende procoaguleremose, får 5-drops uden effekt. Fæder raskt barn. Bløder efterfølgende 1900 ml	25 sug x 1	5 timer efter - voldsomme veer	Nej
8	2007	Uterusruptur på varmt uterus. Hysterectomi indlægges på hospitalet. Menopausal 20%	Efter fødslen af raskt barn bløder pr voldsomt. Manuelt placentalmedie. I det næste, men forsat voldsom blødning. Ved en eksplorativ laparotomi findes en 15 cm lang uterusruptur i højre side, men pga forsat voldsom blødning efter suturering læres hysterectomi. Efterfølgende lød pt af hovedpine og ubehag og fik diagnosticeret Sheehans syndrom (dette af hypofyse er nedlagt)	25 sug x 2 - en pr dag		Ja
9	2009	Fødsel efter usædvanligt venenier. Barn ægget 3/1. Særligt i dag	gangene 10 dg over formlen. 5-6 alvorlig rigtige veer - men bløder og 8-4 cm. Kvinden beskrives veer som konstante, voldsomme og perioder er hun efter eget udsagn ikke kontaktbar. CTG paroxysmal. Konvulsivitet, hyperton uterus og nedslid	25 sug x 2 hver 2 dage, heraf sidste dosis 50 sug	3 timer efter sidste indlæg (fødselsforløb)	Nej
10	2009	Vestorm og ukontrolleret blødning 8 liter. Hysterectomi	Vestorm under fødslen. Fæder 1 barn ph 7.11, veer og 100 ml. Bløder efterfølgende 8 liter og må hysterectomiseres pga fare for cardiovascular kollaps.	25 sug x 1	17 timer efter opløst blødning starter (vestorm tidligere)	Nej
11	2009	Ruptur på varmt uterus. Afdeling barn - i dag spættik Blødning 10 liter	gangene, veerne fæder ud under prøvperiode og der opættes 5-drops. Efter 9 time pludselig daglig og voldsomme blod smerter. Katastrofekt. Barn ægget 1/1, 4/1, 5/10 ph 6.68 idag spættik. Uterusruptur var i hele bagfaldet og revet af fra vagina. Blodtab 10 liter	25 sug x 1	10 timer efter uterus ruptur	Nej
12	2009	Vestorm Dødt barn	1 para får Minoxiprolole efter vandgang. 4 timer senere hyppige veer, der går over i hyperstimulation. Pga manglende beh af dette barn mangl. Kort overvågning, barnet død ved fødsel	25 sug x 1	8 timer efter - hyperstimulation	Nej (ikke for vi gar opmærksom på det)
13	2010	Vestorm Dødt barn Placentalavring	Da barn ambulat. Smerter, der pludselig går over i vestorm i hjemmet, voldsomt forpint og vir kalder ambulance. Inden for 10 minutter beg præstetrang. Da fæder ankommer er der 1-2 mm ml veer af parret. Bæren rogn ud i ambulancen pga voldsomme forløb. Gæser i ambulancen, grant vand. Barn død ved ankomst til hospital	25 sug x 1	16 timer efter- voldsom ventorm	Nej - læge/ sygehus nægter at indberette/ har muligvis indberettet efter debat i marts 10
14	2012	Placentalavring Dødt barn	gangene 6 timer efter spont vandlig. Kort efter hjemkomst beg blødning i hjemmet, barn død ved ankomst til hospital. Læring konstateres på 1/3 - 1/2 af placenta	50 sug x 3 pr os	2 timer efter- rigelig blødning	Nej - ikke så vidt vides
15	2012	placentalavring i prøvperiode	1 para - fæder 5/1 time. Stærk forpint, responsivt kamp på morfin. Barn og placenta fædes på samme tid. Barn Ægget 4/1, 4/5, 10/20, ph 7.14. Post partum blødning 800 ml	25 sug x 1	15 timer efter- placentalavring	Ja, jordemoder
16	2012	lynfødsel svært forpint	1 para - aktiv fødsel 2 i og 20 min.	25 sug x 2 - en pr dag	11 i til aktiv fødsel	Ja, jordemoder
17	2012	lynfødsel svært forpint	1 para - lynfødsel svært forpint. 1 fæder 45 min. Modus udslid fødsel på 20 timer	25 sug x 1	8 i til aktiv fødsel	Ja, jordemoder
18	2012	alvorlig blivning	Brev fra SST til jordemoderfor. Sept 12: SST taler om en alvorlig blivning eller brug af Minoxiprolole til gangangstelse af en fødsel hos en kvinde, der tidligere havde fået foretaget kejsersnit	25 sug x 1	8 i til aktiv fødsel	Ja, jordemoder

Kendt fra Agindstg DR 2012. Findes indberettede: 12 som blivninger hos SST
 Nye sager: Marts 2013
 Sager vi har kendskab til via nettet