



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 25. april 2013
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSBPE
Sags nr.: 1301644
Dok nr.: 1194801

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 22. marts 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 504 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 504:

"Kan ministeren redegøre for den nyeste forskning omkring sammenhængen mellem ECT og dødsfald?

Vil ministeren endvidere oplyse, om Sundhedsstyrelsen har kendskab til tilfælde af dødsfald i forbindelse med brugen af ECT, jf. SUU alm. del – bilag 153 og 216?"

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet følgende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen:

"Sundhedsstyrelsen skal vedr. nyere forskning henvise til to registerstudier omfattende store patientpopulationer.

Det drejer sig om en stor dansk undersøgelse fra 2007 (Munk-Olsen et al., 2007), hvor man på grundlag af foreliggende registerdata omfattende knap 800 patienter, som har fået ECT behandling i årene 1976 – 2000, sammenlignet med ca. 5800 psykiatriske patienter, der ikke havde fået ECT, påviser, at dødeligheden af naturlige årsager samlet set var lavere for patienter i gruppen, der havde fået ECT end for de andre psykiatriske patienter. For så vidt angik ikke-naturlig død fandtes dog en let øget hyppighed af selvmord i gruppen, der havde fået ECT sammenlignet med andre patienter.

Endvidere foreligger der en stor amerikansk undersøgelse publiceret i 2011 (Watts et al., 2011), hvor der i umiddelbar forbindelse med 73.440 ECT-behandlinger foretaget ved amerikanske veteranhospitaler i perioden 1998 – 2009 ikke blev fundet noget dødsfald forårsaget af ECT-behandling overhovedet.

Risiko for dødsfald forårsaget af ECT-behandling må således konstateres at være ekstremt lille."

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Susanne Beck Petersen