



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 23. november 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMBBM
Sags nr.: 1210916
Dok nr.: 1095118

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 25. oktober 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 69 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 69:

"Vil ministeren oplyse om det er korrekt, at det er mindre skadeligt at bruge snus, end andre røgfrie tobaksprodukter?"

Svar:

Til brug for min besvarelse har jeg indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

"Der findes en række forskellige produkter, der går under betegnelsen snus, og en lang række øvrige røgfrie tobaksprodukter. Produktionsformer og indhold af de forskellige stoffer – herunder nikotin og kræftfremkaldende stoffer – varierer fra produkt til produkt. Det er derfor ikke muligt at give et præcist svar på det stillede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen kan dog oplyse, at alle røgfrie tobaksprodukter indeholder nikotin og en lang række kræftfremkaldende stoffer. 28 forskellige kræftfremkaldende stoffer er blevet identificeret i røgfrie tobaksprodukter, heriblandt forskellige nitrosaminer, formaldehyd, benzopyren samt en række tungmetaller. De kræftfremkaldende stoffer findes i forskellige koncentrationer i de forskellige produkter. Røgfrie tobaksprodukter er generelt klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af IARC (Det Internationale Kræftforskningscenter under WHO). Det er især en øget risiko for kræft i bugspytkirtlen, der er forbundet med brug af røgfrie tobaksprodukter, herunder snus.

Endvidere ses en øget risiko for kræft i mund og svælg i en del undersøgelser. Dette er især fundet i amerikanske studier, hvor deltagerne har brugt amerikanske snusprodukter, hvorimod hovedparten af nordiske undersøgelser ikke finder en sådan sammenhæng ved brug af svensk snus.

Det er også dokumenteret, at brug af røgfrie tobak påvirker blodtryk og puls. Brug af røgfrie tobak øger risikoen for at dø efter et hjerteanfald, men brugen øger tilsyneladende ikke risikoen for at få et hjerteanfald. Endvidere medfører

røgfri tobaksprodukter til oralt brug en betydelig risiko for skader på slimhinderne i munden, men de fleste af disse skader forsvinder, når man ophører med at bruge det. Nye undersøgelser fra Sverige tyder på, at brug af snus under graviditeten øger risikoen for svangerskabsforgiftning og tidlig fødsel.”

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Brit Borum Madsen