



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 1. oktober 2013
Enhed: Sundhedsjura og læ-
gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMBGB
Sags nr.: 1304520
Dok nr.: 1303910

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12. september 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 919 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 919:

"Hvor mange borgere var i behandling med benzodiazepiner og lignende sove- og angstdæmpende midler i 2012 og 2011 udover de max. 4 uger, som Sundhedsstyrelsen anbefaler?"

Svar:

Jeg har anmodet Statens Serum Institut om bidrag til besvarelse af spørgsmålet.

Statens Serum Institut har oplyst følgende:

"Det er muligt at opgøre de enkelte borgeres køb af benzodiazepiner, men man kan ikke ud fra købsoplysningerne præcist opgøre, hvor længe borgerne har været i behandling.

For alligevel at give en indikation af behandlingsvarigheden kan man opgøre hvor mange borgere, der har købt mere end 30 døgndoser (DDD) i løbet af et år. Grænsen er sat til 30 DDD frem for 28 DDD, som ellers vil svare til 4 ugers forbrug, da mange af de købte pakninger indeholder præcist 30 DDD.

Ud fra denne definition kan man af nedenstående tabel se, at ca. 221.000 personer i 2011 og ca. 211.000 personer i 2012 havde et køb af benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler, som oversteg et køb svarende til 4 ugers behandling.

For begge år svarer det til, at ca. 58 pct. af de borgere, som har købt lægemidlerne, har købt mere end 30 DDD.

Tabel 1: Antal personer, der har indløst recept på benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler i 2011 og 2012.

År	Antal personer i alt	Antal personer, der har indløst recept på mere end 30 DDD
2011	382.249	220.962
2012	363.007	210.525

Kilde: Lægemiddelstatistikregister

Anm.: Opgørelsen er baseret på oplysninger om receptudskrivelser til enkeltpersoner af benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler (ATC-kode N05BA, N05CD, N05CF samt N03AE01).

En DDD er en Defineret Døgndosis, som svarer til en gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis per dag for en voksen, der får lægemidlet til dets primære anvendelse. Fastsættes af WHO ud fra global anvendelse. Ikke alle har indtaget en DDD om dagen – nogen mere og nogen mindre.

Usikkerheder ved opgørelsen omfatter:

- Den købte mængde i DDD kan ikke direkte overføres til længden på personernes behandling. Det kan dog give en idé om omfanget.
- Nogle af personerne i gruppen, der indløser mere end 30 DDD per år, kan evt. være personer med to kortvarige adskilte forløb inden for samme år.

For information om forbruget af benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende lægemidler for tidligere perioder henvises til:

<http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Analyser%20og%20rapporter/Lagemiddelforbrugsanalyser/Laegemiddelgrupper/Benzodiazepiner%20og%20bezodiazepinlignende%20omidler.aspx>

. / . Jeg kan henholde mig til Statens Serum Instituts udtalelse, som vedlægges besvarelsen af SUU alm. del spm. 919.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Birgitte Gram Blenstrup