



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 8. oktober 2013
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPJTB
Sags nr.: 1304526
Dok nr.: 1297522

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12-09-2013 stillet følgende spørgsmål nr. 931 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 931:

"Er ministeren enig i konklusionen af undersøgelsen, udarbejdet af Christian Juhl Terkelsen fra 2010 og publiceret i det internationalt anerkendte lægetidskrift JAMA, der dokumenterer, at dødeligheden for patienter, der har fået behandling inden for en time, er væsentligt mindre end dødeligheden for de patienter, hvor der er gået mere end en time, før behandlingen startede?"

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Den øgede dødelighed efter en time var et delresultat i undersøgelsen og ikke en enkeltstående konklusion.

Undersøgelsen konkluderer generelt, at øget dødelighed hang sammen med forsinkelse af primær PCI hos patienter med STEMI – og at nøglen til at øge overlevelsen hos disse patienter kan være øget fokus på at minimere den samlede forsinkelse ved at optimere præhospital diagnostik, triage og logistik.

Sundhedsstyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at forfatteren til artiklen Christian Juhl Terkelsen er en af de førende eksperter på området i Danmark og derudover er førsteforfatter på en sammenfattende artikel i Cardiologisk Forum fra august 2013, hvor konklusionen er: "Samlet set vurderes det, at vi i Danmark har et ideelt set-up til behandling af STEMI-patienter, såfremt vi udnytter den præhospital diagnostik kombineret med visitation direkte til hjertecenter med assistance fra akutlæger om nødvendigt og ved brug af helikopter ved lang transporttid. De danske forbehold til ESC guidelines vurderes relevante og i helt i tråd med nylige britiske NICE guidelines.""

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger, og i øvrigt henvise til mit svar på spørgsmål 912.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Jeppe Troels Berger

