



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 8. oktober 2013
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPJTB
Sags nr.: 1304624
Dok nr.: 1301162

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 17-09-2013 stillet følgende spørgsmål nr. 957 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Benedikte Kiær (KF).

Spørgsmål nr. 957:

"Ministeren bedes oversende en tabel, der viser, hvor patienter, der døde inden for 30 dage efter at have fået udført akut PCI, blev behandlet, og hvilken behandlingsmetode der blev anvendt."

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Af Dansk Hjerteregisters årsrapport for 2012 fremgår følgende:

Dødelighed inden for 30 dage for primær PCI.

Antal døde (tæller) i forhold til samlet antal patienter (nævner), konfidensintervaller på procentsats udeladt:

Rigshospitalet	63/922	6,8 %
Roskilde Sygehus	0/2	0,0 %
Odense Hospital	29/575	5,0 %
Skejby Sygehus	20/473	4,2 %
Aalborg Sygehus	18/240	7,5 %

Det skal bemærkes at Roskilde Sygehus ikke varetager funktionen, og derfor ikke burde forekomme i tabellen. De to patienter kan være registreringsfejl eller nødprocedurer i relation til patienter der har været indlagt til planlagt intervention, hvor der er opstået en komplikation."

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger og i øvrigt henvise til mit svar på spørgsmål 925.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Jeppe Troels Berger