



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 17. juni 2014
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPSBRE
Sags nr.: 1403350
Dok nr.: 1474999

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 22. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 811 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 811:

"Vil ministeren med henvisning til SUU alm. del - bilag 424 oplyse, hvilket antal patienter de givne procentsatser svarer til?"

Svar:

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra Region Midtjylland, som jeg henholder mig til:

"Af patienterne med fibromyalgi havde 67 % (73 ud af 109) det bedre 1 år efter afsluttet behandling. 25 % (27 ud af 109) oplevede en meget stor forbedring, yderligere 18 % (20 ud af 109) en væsentlig bedring. Af dem der modtog intensiv psykologisk behandling havde 12 % (8 ud af 69) et fysisk helbred der var ens eller bedre end befolkningsgennemsnittet 1 år efter afsluttet behandling, hvilket var tilfældet for 3 % (1 ud af 40) hos dem, der modtog individuel rådgivning.

Af patienterne med kronisk træthedssyndrom havde 65 % (60 ud af 93) det bedre 1 år efter afsluttet behandling. 25 % (23 ud af 93) oplevede en meget stor forbedring, yderligere 14 % (13 ud af 93) en væsentlig bedring. Af dem, der modtog intensiv psykologisk behandling, havde 12 % (7 ud af 57) et fysisk helbred, der var ens eller bedre end befolkningsgennemsnittet 1 år efter afsluttet behandling, hvilket var tilfældet for 0 % (0 ud af 36) hos dem der modtog individuel rådgivning.

Af patienterne med irritable tyktarm havde 58 % (31 ud af 53) det bedre 1 år efter behandlingen. 21 % (11 ud af 53) oplevede en meget stor forbedring, yderligere 15 % (8 ud af 53) en væsentlig bedring. Af dem der modtog intensiv psykologisk behandling havde 12 % (4 ud af 34) et fysisk helbred der var ens eller bedre end befolkningsgennemsnittet 1 år efter afsluttet behandling, hvilket var tilfældet for 0 % (0 ud af 19) hos dem der modtog individuel rådgivning".

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Sarah Bang Refberg