



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 19. august 2014
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPMHE
Sags nr.: 1403481
Dok nr.: 1507944

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 16. juni 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 891 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 891:

”Kan ministeren i forlængelse af svar på SUU alm. del spørgsmål 722 bekræfte, at de fleste som kun møder poliovirus, vil kunne blive raske smittebærere, og at der dermed er en stor risiko for, at poliovirus kan være sluppet løs og være en trussel i kloakvandet, lang tid før det opdages i en afføringsprøve? Vil ministeren i bekræftende fald redegøre nærmere for, hvorfor ministeren finder, at det nuværende system er tilstrækkelig sikkert?”

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen og kan på den baggrund oplyse følgende:

Over 90 % af de personer, der første gang bliver smittet med poliovirus, er symptomfri, men udskiller ligesom patienter med symptomer virus især i afføringen og i mindre grad i svælgsekret. Virusudskillelsen i afføringen varer typisk 3-6 uger og i svælgsekret op til en uge. Hos fuldt vaccinerede kan ses virusudskillelse i begrænset omfang dog uden, at personerne bliver syge.

Poliovirus udskilt af personer, der for nylig har opholdt sig i områder, hvor poliovirus cirkulerer, vil formentlig fra tid til anden kunne findes også i kloakvand i Danmark, men smitte herfra anses for at være usandsynligt.

Den væsentligste smittevej er direkte fra person til person via afføring.

I Danmark er de sanitære forhold gode, ligesom befolkningens mulighed for at opretholde en høj hygiejnestandard også er det.

Under danske forhold er det væsentligste for at forebygge smitte ind i landet og for at forebygge smitteoverførsel i landet at sikre, at befolkningens vaccinationsstatus er høj.

Som det fremgår af min besvarelse af SUU alm. del spørgsmål 722 af 23. maj 2014, er der i lyset af den nye situation med opblussen af polio forskellige steder i verden iværksat forskellige forholdsregler, herunder i forbindelse med vaccination og overvågning.

Senest har Sundhedsstyrelsen anbefalet rejsende til visse lande at overveje poliovaccination. Dette er sket i henhold til anbefaling fra WHO, jf. <http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/ekstra-poliovaccination-ved-laengere-ophold-i-pakistan,-syrien,-cameroun-eller-equatorial-guinea>.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Mette Touborg Heydenreich