



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Socialudvalg

Dato: 12. december 2014
Enhed: Sundhedsjura og læ-
gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMDRA
Sags nr.: 1405285
Dok nr.: 1588741

Folketingets Socialudvalg har den 3. november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 42 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

Spørgsmål nr. 42:

"Vil ministeren som opfølgning på samråd den 31. oktober 2014 om brug af morfika i behandlingen af ældre oplyse, om ministeren mener, at det er – eller ikke er - et problem med forbruget af såkaldte smerteplastre med morfika i Danmark, når der nu er internationale anbefalinger af, at man bør bruge det"

Svar:

Jeg forstår spørgsmålet således, at der spørges til, om jeg finder, at danske ældres forbrug af morfin er et problem, når der er internationale anbefalinger, der fraråder brugen af morfin til ældre.

Indledningsvist vil jeg henvise til min besvarelse på spørgsmål 41.

Dernæst vil jeg anføre, at Sundhedsstyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om lande, der fraråder brug af morfin til ældre. Om ældre og morfin kan jeg dog oplyse, hvad der fremgår af produktresuméet for morfin og morfinlignende stoffer, og om den advarsel som Sundhedsstyrelsen har udsendt om morfinplastre i forhold til bivirkningsindberetninger i EU.

Af produktresuméer for morfin og morfinlignende stoffer angives det generelt, at der skal udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter samt patienter med nedsat lunge-, lever- eller nyrefunktion. Årsagen hertil er risiko for overdosering, der kan medføre hæmning af åndedrættet (respirationsdepression). Dette gælder uanset lægemiddelformen – fx plastre eller tabletter.

Herudover har Sundhedsstyrelsen på baggrund af alvorlige bivirkningsindberetninger i EU om morfinplastre (Fentanylplastre) i styrelsens nummer af "Nyt om bivirkninger" fra juni 2014 fortalt om indberettede tilfælde, hvor børn har pilleret plastre af huden og indtaget dem, hvilket har haft dødelig udgang. Derfor anbefales det af Sundhedsstyrelsen og i hele EU, at plastre til børn og demente bør anbringes et sted på kroppen, hvor patienten ikke kan komme til at fjerne det.

Der skal således udvises forsigtighed ved ordination af morfin til ældre, og der skal iagttages forhold i håndteringen af smerteplastre af hensyn til patientsikkerheden, men der kendes ikke til internationale anbefalinger om, at ældre ikke bør behandles med morfin.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Dorthe Rodian Arleth