



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 28. januar 2015
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMEER
Sags nr.: 1500303
Dok nr.: 1632899

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 374 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 374:

”Vil ministeren, på baggrund af svaret på SUU alm. del - spørgsmål 346 om narkorelaterede dødsfald, præcisere og redegøre for de enkelte typer narkorelaterede dødsfald (forgiftninger, overdosis, hepatitis osv.) opgjort for hver af de fem regioner og indsat i diagram regionsvist.”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende bidrag fra Statens Serum Institut, hvortil jeg kan henholde mig:

”Statens Serum Institut har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet et bidrag, som er baseret på Rigspolitiets register over narkotikarelaterede dødsfald.

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at antallet af narkotikarelaterede dødsfald baseret på Rigspolitiets register har været på 210 dødsfald i 2012 og på 213 dødsfald i 2013, svarende til en stigning på 1,4 pct.

Udviklingen i det samlede antal narkotikarelaterede dødsfald gennem årene fordelt på de enkelte regioner fremgår af nedenstående tabel.

Antal narkotikarelaterede dødsfald, efter region, 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nordjylland	35	33	32	28	25	24
Midtjylland	47	53	60	56	37	47
Syddanmark	68	79	78	91	54	36
Hovedstaden	59	86	70	69	61	80
Sjælland	24	21	31	33	26	21

Kilde: Rigspolitiet 2014.

Anm.: De regionale tal summer ikke til tallet på landsplan, da registeret ikke indeholder adresseoplysninger på alle afdøde personer.

Det samlede antal dødsfald i politiets opgørelse omfatter dødsfald, hvor der er sket indberetning til politiet med henblik på medikolegalt ligsyn, og hvor der samtidig foreligger oplysninger om et problematisk forbrug. Langt de fleste (ca.80 pct. årligt på landsplan) af disse dødsfald skyldes forgiftninger.

De resterende skyldes anden form for narkotikarelateret død – fx anden ulykke end forgiftning, sygdom eller ukendt dødsårsag. Sundhedsstyrelsen kan ikke komme disse ”øvrige” dødsfald nærmere mht. dødsårsag og døds måde.

I 2013 var andelen af forgiftningsdødsfaldene i hele landet på 77 pct. 23 pct. skyldes anden form for narkotikarelateret død.

Ses der på andelen af forgiftninger i 2013 regionsfordelt, ses den højeste andel forgiftninger i regionerne Nordjylland og i Hovedstaden, jf. nedenstående tabel.

Narkotikarelaterede dødsfald, efter region og forgiftning/ej forgiftning, 2013

Region	Årsag	Antal	Andel forgiftningsdødsfald (%)
Nordjylland	Forgiftningsdødsfald	20	83
	Ikke-forgiftningsdødsfald	4	
Midtjylland	Forgiftningsdødsfald	29	61,7
	Ikke-forgiftningsdødsfald	18	
Syddanmark	Forgiftningsdødsfald	29	80,6
	Ikke-forgiftningsdødsfald	7	
Hovedstaden	Forgiftningsdødsfald	66	82,5
	Ikke-forgiftningsdødsfald	14	
Sjælland	Forgiftningsdødsfald	15	71,4
	Ikke-forgiftningsdødsfald	6	

Kilde: Rigspolitiet 2014.

Anm.: De regionale tal summer ikke til tallet på landsplan, da registeret ikke indeholder adresseoplysninger på alle afdøde personer.”

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Erich Erichsen