



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 17. februar 2015
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMLS
Sags nr.: 1500544
Dok nr.: 1632962

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 409 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 409:

” Vil ministeren oplyse, hvor mange danske angstpatienter der udelukkende modtager terapeutisk behandling hos f.eks. psykolog, hvor mange angstpatienter som udelukkende modtager medicinsk behandling, og hvor mange patienter som modtager både terapeutisk og medicinske behandling for angstlidelser. Svaret bedes opgjort regionsvist fordelt på de tre patientgrupper. ”

Svar:

Indledningsvist kan jeg oplyse, at en besvarelse af sidste delspørgsmål forudsætter et egentligt forskningsprojekt, der bl.a. indebærer samkøring af oplysninger af forskellige personhenførbare oplysninger fra flere sundhedsregistre. Dette arbejde vurderes at ligge udover normal arbejdsbyrde ift. besvarelsen af alm. del spørgsmål, og fremgår derfor ikke af indeværende svar.

Til den videre besvarelse af spørgsmålet, har jeg indhentet et bidrag fra Danske Regioner, der oplyser antallet af personer, der har modtaget tilskudsberettiget behandling for let til moderat angst hos privatpraktiserende psykolog, siden denne mulighed kom til. Antallet af patienter, fordelt på hver region, fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Antal patienter med henvisningsårsagen let til moderat angst fordelt på region

	maj-dec 2011	2012	2013	jan-nov 2014	Total
Region Hovedstaden	610	2.144	2.925	3.365	6.556
Region Midtjylland	438	1.499	1.918	2.142	4.209
Region Nordjylland	256	876	1.051	1.099	2.281
Region Sjælland	160	677	963	1.104	2.199
Region Syddanmark	441	1.346	1.839	2.023	4.006
Total	1.898	6.466	8.630	9.659	18.977

Kilde: CSC Scandihealth

Obs. Der er tale om antallet af unikke patienter. Summerer man over regioner vil tallet ikke svare til totalen, da nogle patienter har modtaget behandling i flere regioner.

Ligeledes vil summen af årene ikke svare til den præsenterede total, da nogle patienter har modtaget behandling i flere af årene. Tallet i nederste højre hjørne er det totale antal patienter der har modtaget behandling for angst i den givne periode. Hver patient tæller kun en enkelt gang.

Jeg har endvidere indhentet et bidrag fra Statens Serum Institut, der oplyser følgende for så vidt angår antallet af patienter, der modtager medicinsk behandling for deres angstlidelse:

"En række lægemiddelgrupper som blandt andet antidepressiva, antiepileptika, benzodiazepiner (anxiolytika) og antipsykotika kan benyttes ved angstbehandling.

For gruppen af benzodiazepiner (anxiolytika) er indikationen forholdsvis velafgrænset til primært at omfatte angst. I de andre lægemiddelgrupper anvendes medicinen imidlertid ikke udelukkende ved angst men også ved andre lidelser. Det kan være depression, social fobi, obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), post-traumatisk stresstilstand, spiseforstyrrelser, visse typer af smerter og epilepsi.

I Lægemiddelstatistikregisteret er indikationskoderne inden for ovennævnte lægemiddelgrupper mangelfuldt indberettet. Det vurderes derfor ikke muligt på baggrund af disse at udarbejde en fyldestgørende opgørelse for antallet af patienter, der modtager medicinsk behandling for en angstlidelse."

Supplerende kan jeg oplyse, at læger i Danmark har fri ordinationsret. Det betyder, at lægen ikke er forpligtet til kun at anvende markedsførte lægemidler på de af Sundhedsstyrelsen godkendte indikationer. Hvis en læge ud fra sin viden og erfaring skønner, at et bestemt lægemiddel vil gavne en patient på andre indikationer (sygdomme) end det er godkendt til, må lægen gerne ordinere lægemidlet i den konkrete situation.

Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at der er stor forskel på behovet for behandling, støtte og omsorg hos mennesker, der på et tidspunkt i livet oplever psykiske problemer eller en egentlig psykisk lidelse, herunder rammes af angstlidelser. Patientens behov for at modtage terapeutisk behandling, medicinsk behandling eller en kombination af de to behandlingstilbud, vil til alle tider bero på en konkret lægefaglig vurdering i samråd med patienten.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Lærke Steenberg Smith