



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 4. maj 2015  
Enhed: Sundhedsjura og læ-  
gemiddelpolitik  
Sagsbeh.: DEPCRV  
Sags nr.: 1502756  
Dok nr.: 1703388

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 29. april 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 830 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 830:

"Vil ministeren oplyse, hvor mange indberetninger der i alt har været om vaccineskader ved HPV-vaccinen?"

Svar:

Jeg har anmodet Sundhedsstyrelsen om en udtalelse til brug for besvarelsen af spørgsmålet.

Styrelsen oplyser, at der i Danmark er vaccineret mere end 480.000 piger og kvinder. På verdensplan er mere end 55 mio. vaccineret mod HPV.

Den seneste samlede opgørelse over indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen er offentliggjort i Sundhedsstyrelsens elektroniske nyhedsbrev "Nyt om Bivirkninger" i marts 2015. Den viser, at der er modtaget i alt 1228 indberetninger, jf. tabel 1:

*Antal solgte doser og antal bivirkningsindberetninger for årene 2009-2014*

HPV-vaccine	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Antal indberetninger	288	66	43	96	511	224	1228
Antal alvorlige	25	5	6	18	177	91	322
Antal solgte doser	347.690	151.476	163.374	349.730	488.224	114.457	1.614.951

*Tabel 1. Antallet af bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden 2009 til 31. december 2014. Tabellen viser det samlede antal indberetninger, og hvor mange heraf der er alvorlige. Antal solgte doser i Danmark er ligeledes vist.*

Det bemærkes, at piger under 14 år skal have to vacciner for at være dækket af vaccinen.<sup>1</sup> Vaccinerne gives med minimum 6 måneders interval, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for et år. Såfremt dette ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

<sup>1</sup> Ændring i vaccinationsprogrammet pr. august 2014 fra tre-dosis til to-dosis.

Piger over 14 år skal have tre vaccinationer for at være dækket. Den 2. vaccine gives almindeligvis 2 måneder efter den første, og den 3. normalt fire måneder efter den anden. Alle tre vacciner bør gives inden for et år.

Som tabellen viser, er der derfor givet ca. tre gange så mange doser af vaccinen som antallet af vaccinerede personer.

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, hvor mange der er i behandling for bivirkninger som følge af HPV-vacciner. Statens Serum Institut har oplyst, at der ikke findes tilgængelige data om dette i Landspatientregistret.

Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen oplyste.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Camilla Rosengaard Villumsen