



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 28. september 2015  
Enhed: Sygehuspolitik  
Sagsbeh.: SUMKKO  
Sagsnr.: 1505214  
Dok. nr.: 1768761

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 1. september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 88 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 88:

”Hvad er ministerens holdning til at hæve kravene for, hvornår man skal sendes til kikkertundersøgelse, jf. professor John Brodersens udtalelser?”

Svar:

Det nationale tarmkræftscreeningsprogram bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft fra maj 2010, senest revideret i november 2012.

Tærsklen for, hvornår der skal tilbydes kikkertundersøgelse, er en sundhedsfaglig vurdering. Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet derfor indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser:

”Afføringsprøven, som borgeren indsender til et laboratorium, undersøges maskinelt ved at måle indholdet af ikke synligt blod i prøven. ’Tærskelværdien’ eller ’cut-off grænsen’ er en fastsat standard som anvendes til at afgøre, om en prøve betragtes som positiv eller negativ.

Fastsættelsen af tærskelværdien skal baseres på evidens og erfaring, herunder afvejning af risikoen for falsk positive og falsk negative svar, således at personer med tilstanden adskilles fra personer uden tilstanden så nøjagtigt som muligt ud fra de forudsætninger, som ligger i det specifikke screeningsprogram og testmetoden.

Tærskelværdien for den immunkemiske metode, der anvendes i screeningsprogrammet, er fastlagt ud fra internationale studier. Tærskelværdien for, hvornår en prøve betragtes som positiv, er således den samme på landsplan.

Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der pågår et studie som undersøger analysekvaliteten af de immunkemiske metoder. Dette studie og den kommende monitorering kan være med til mere kvalificeret at evaluere kvaliteten af analysen og dermed evaluere de anvendte tærskelværdier i screeningsprogrammet. Den kommende evaluering af disse resultater vil indgå i Sundhedsstyrelsens løbende dialog med fagfolk og regioner vedr. behov for justeringer i screeningsprogrammet.”

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens bidrag, og i øvrigt også henvise til mit svar på SUU alm. del spørgsmål 86 fra samme spørger.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Kirstine Korsager