

Fredericia, den 13.05.2016

Oversete bivirkninger ved HPV vaccinen

Gardasil er af producenten Merck beskrevet at have en høj bivirkningsfrekvens, over 3,2 %, hvoraf 1/3 alvorlige, og bivirkningerne består af over 40 forskellige symptomer. Derfor kan det undre at sundhedsmyndighederne bliver ved med at kræve, at der skal føres bevis for at Gardasil giver bivirkninger!

Endvidere bruger Merck aktivt stof som "placebo" – dette er uetisk og uvidenskabeligt!

Gardasil 9 der bliver markedsført i nær fremtid er mere giftig end Gardasil og Cervirax. Det er de mikroskopiske aluminium adjuverede nanopartikler der er skyld i bivirkningerne, de små partikler påvirker ved deres indtrængen i cellerne forskellige strukturer, hvorved de mange bivirkninger udløses. Dette sker ved forskellige reaktioner, autoimmune eller allergiske, eller ødelæggelse af mitokondrier, eller uden tvivl også andre måder som forskere rundt om i verden lige nu er ved at finde ud af.

Jeg vil i det følgende beskrive bivirkninger udløst af aluminium adjuverede nanopartiklers indflydelse på de kvindelige æggestokke, deres effekt på fosteret, når de overføres fra moders blod via moderkagen til fosteret, samt partiklernes indflydelse på barnet, når det via modermælken indtager partiklerne peroralt.

Den sygdom, de aluminium adjuverede nanopartikler udløser, er myalgisk encephalomyelit (ME). ME er en fysisk sygdom der udløses af tungmetaller, vacciner, vira, bakterier, svampe og traumer, hvilke betyder at en krop der er påvirket af disse udløsende årsager kan få sygdommen til at bryde ud i lys lue blot ved én enkelt vaccination eller infektion. Det vil altså sige, at der under tiden ikke skal meget til at hæve de skadelige agens over tærsklen, således ME udløses.

Når kvindens æggestokke bliver ramt af de mikroskopiske aluminium adjuverede nanopartikler kan det bevirke ødelæggelse af hormonproduktionen og derved hindre menstruationen, forårsage øget aborthyppighed, og for tidlig fødsel, som regel fra uge 24 og frem.

Eksempel 1: En ung kvinde henvises til Odense Universitets Hospital for at blive insemineret, hun har valgt at være alenemor af personlige årsager. For at blive insemineret kræver lægerne hun bliver HPV vaccinevaccineret, og hun udvikler bivirkninger i middelsvær grad. Hun får lavet i alt 7 forsøg, 3 uden og 4 med hormoner, alle mislykkedes.

Eksempel 2: Ung kvinde får 3 Gardasil vacciner i 2011 og frem. Hun udvikler i slutningen af 2012 mange HPV bivirkninger, og typisk viser alle undersøgelser intet abnormt. I 2013 var hun meget syg, bliver gravid men aborterer. Igen i maj 2015 bliver hun gravid og føder i 26. Uge og bliver indlagt på Neonatalafdeling. Kvinden talte med de andre patienter som havde født for tidligt, men som ikke var klar over at det kunne skyldes de havde fået HPV vaccinen. Et opslag på en præmatur facebookside bevirkede hurtigt kontakt fra 66 kvinder, der alle havde født for tidligt, og havde fået HPV vaccinen forud for graviditeten. Sygehusets læger begyndte at spørge de gravide, om de havde fået HPV vaccinen.

Når de mikroskopiske aluminium adjuverende nanopartikler går fra den bivirkningsramte moder via moderkagen til fosteret vil dette kunne udvikle HPV bivirkninger hos barnet.

Eksempel 3: Ung kvinde HPV vaccineres i 2012 og frem, udvikler mange bivirkninger. Har nogle ufrivillige aborter. 2013 gennemfører hun en graviditet til uge 40, vandet er mørkegrønt og hjertelyden dykker mange gange, men barnet retter sig. Der ammes de første 50 dage, men dette stopper så på grund af, at barnet skriger og vrider sig af mavesmerter når det ammes, og barnet får derefter modermælkserstatning. Da barnet er knap 2 måneder bliver det indlagt på grund af slaphed/ bevidstløshed. Har flere slaphedstilfælde under indlæggelsen og diverse prøver viser intet abnormt. Moderen får beskeden at bevidstløshedsanfaldene skyldes, at barnet er rødhåret.

Eksempel 4: Ung kvinde med omkring 40 bivirkninger efter HPV vaccinen bliver gravid og føder til terminen i sommeren 2014. Det var med noget besvær fødslen kom i gang, så det endte med IV drop. Fostervandet var mørkegrønt. Barnet trak ikke vejret de første 8 minutter, og endte i kuvøse de første 4 døgn. I den første leveuge var barnet overfølsomt ved berøring, lys, lyd og der var sitren og spjæt i ekstremiteterne, og det sov meget. Sutterrefleksen var ikke god, og barnet blev derfor sondemadet. I starten fik han for meget og havde meget gylp. 30 minutter efter måltidet begyndte han at skriges, og det varede ca. 3 timer hver gang, og barnet lå altid med benet krøllet op under sig. Helt åbenbart havde barnet mange smerter, for det bestilte ikke andet end at skriges og græde det første år.

Barnet fik de 2 første børnevaccinationer, og hver gang blev det mere sygt end det var i forvejen, barnet besvimeede flere gange i ugerne efter vaccinationen, havde problemer med at få luft, derfor fravalgte moderen yderligere vaccinationer.

På grund af mange mellemøres betændelser fik barnet på et tidspunkt indsat titaniumdræn i øret og barnet skreg efter dette, og moderen måtte nærmest tvinge ørelægen til at fjerne dem igen. Barnet faldt til ro 1 time efter det var gjort.


Mødre med ME udløst af Gardasil kan overføre nanopartikler til deres fostre som kan fødes med ME, som forværres de første levemåneder på grund af amning. Lægerne er fuldstændig uforstående overfor problemstillingen og kan hverken hjælpe mor eller barn. Dette kan sammenlignes med at narkomaners børn får en ganske speciel behandling for ikke at udvikle abstinenssymptomer – ved man ikke moderen er narkoman kan det tage lang tid inden lægerne finder ud af at barnets symptomer skyldes abstinenser.

Børn født af mødre med ME udløst af HPV vaccinen har en øget tilbøjelighed til at udvikle ME og vaccination af disse børn er derfor kontraindiceret. Det ville stille sig helt anderledes, hvis vaccinen var lavet på biologisk materiale, og jeg vil derfor anmode de danske sundhedsmyndigheder om at stille vaccineproducenterne det krav, at vaccinerne skal være biologiske og uden kunstig DNA og tungmetaller.

Jeg vil på det kraftigste opfordre det danske sundhedsvæsen til at anerkende ME udløst af HPV vaccinen. Alle gravide kvinder skal udspørges om de er HPV vaccinerede, og om de har bivirkninger, således der kan tages ordentlig hånd om fødslen af et HPV bivirkningsramt barn.

Slutteligt vil jeg kraftigt opfordre sundhedsmyndighederne til kun at vaccinere med biologiske vacciner, under forudsætning af de selvfølgelig er lavet under kontrollerede og betryggende forhold.

Med venlig hilsen



Stig Gerdes

Formand for Borgerretsbevægelsen

Og

Praktiserende Læge