



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 19-09-2016
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPAJU
Sagsnr.: 1608220
Dok. nr.: 169440

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 22. august stillet følgende spørgsmål nr. 845 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 845:

”Ministeren bedes redegøre for, om der på andre sygehusafdelinger end intensivafdelingen Køge er registreret problemer med en øget brug af beroligende medicin til patienterne i travle perioder, og i givet fald hvilke afdelinger?”

Svar:

Som det fremgår af mit svar på SUU alm. del 836, så finder jeg det fuldstændig uacceptabelt, hvis patienter bliver medicineret i unødigt omfang.

Det er regionerne, som har driftsansvaret for sygehusene. Det er dermed regionernes opgave at sikre, at både patientsikkerhed og arbejdsmiljø for personalet er i orden på sygehusene, herunder at sikre at der ikke sker unødigt sedering af patienter nogen steder.

Mit ministerium har derfor til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Danske Regioner, som oplyser følgende:

”Regionerne beskriver samstemmende, der ikke er kendskab til andre eksempler på systematisk øget brug af beroligende medicin på grund af travlhed. Der er generelt ikke registreret øget brug af beroligende medicin i travle perioder, og der opleves ikke en sammenhæng mellem øget medicinering og travlhed. Flere regioner har gennemgået rapporterede utilsigtede hændelser fra intensivområdet. Der er ikke fundet hændelser om unødigt sedation grundet travlhed. Det er heller ikke en problemstilling, der kendes fra andre sammenhænge.

Det generelle billede er, at sedering anvendes ved medicinsk behov og i mindst mulig udstrækning. Kortvarig anvendelse af ekstra beroligende medicin i særlige situationer sker altid på baggrund af en konkret klinisk vurdering, for eksempel hvis det vurderes at være nødvendigt for at beskytte patienten. Det er også påkrævet at anvende sovemidler, hvis der er behov for at sænke det intrakranielle tryk i hjernen, samt ved patienter, der er genoplivet efter hjertestop for at beskytte hjernen mod iltmangel.”

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Danske Regioner.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Annemette Juul

