



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 26-09-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPCRV
Sagsnr.: 1705152
Dok. nr.: 420231

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. juli 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 1042 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).

Spørgsmål nr. 1042:

”Ministeren bedes oversende en opgørelse som viser antallet af henvisninger til psykiatrien foretaget fra alment praktiserende læger efter udskrivelse af receptpligtig antidepressiv medicin til børn og unge fra 2010 til 2016.”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Styrelsen oplyser følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Opgørelsen er afgrænset til at omfatte 0-17-årige med første receptindløsning på antidepressive lægemidler udskrevet fra en alment praktiserende læge i perioden 2010 til 2016.

Sundhedsdatastyrelsen har ikke data om henvisninger og kan derfor ikke opgøre antal henvisninger til psykiatrien for børn og unge med receptindløsning på antidepressiv medicin udskrevet af en alment praktiserende læge. I bidraget ses derfor på de 0-17-åriges kontakt til psykiatrien i en periode omkring receptindløsningen. For ikke at overse, at en person allerede er set i psykiatrien inden receptindløsning, ses både på kontakt til psykiatrien i perioden før og efter.

Kontakt til psykiatrien opgøres som kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen og/eller kontakt til privatpraktiserende psykiatere på baggrund af oplysninger fra Landspati-entregisteret og Sygesikringsregisteret. Der ses på kontakt i en periode fra to år før til et år efter receptindløsning. Afgrænsningen på to år før er valgt ud fra receptens gyldighedsperiode, der kan bruges i op til to år efter udstedelse. Afgrænsningen på et år efter receptindløsning er valgt med henblik på at tage højde for eventuel ventetid til behandling i psykiatrien.

Tabel 1 viser antal 0-17-årige med første receptindløsning på antidepressive lægemidler udskrevet af en alment praktiserende læge samlet set og fordelt efter kontakt til psykiatrien i den valgte periode omkring receptindløsning.

Fra 2010 til 2016 falder antallet af 0-17-årige med receptindløsning på antidepressive lægemidler udskrevet af en alment praktiserende læge fra knap 2.000 til 233, jf. tabel 1. Sundhedsstyrelsen indskærpede i 2011 reglerne, så både opstart- og vedligeholdelsesbehandlingen hos børn og unge i alderen 0-17 år med psykiske lidelser nu skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri¹ (VEJ nr 9194 af 11/04/2013).

¹ I akutte tilfælde kan andre læger end speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri starte behandlingen. Dette må dog kun ske efter konference med en speciallæge i børne- eller ungdomspsykiatri. Lægen skal samtidig henvise barnet eller den unge til en vurdering af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Over samme periode gælder det, at en større andel af disse 0-17-årige har kontakt til psykiatrien før og/eller efter receptindløsning. I 2010 har 45 pct. kontakt til psykiatrien i perioden omkring receptindløsning, hvilket stiger til omkring 60 pct. over perioden.

For 2016 skal opgørelsen af kontakt til psykiatrien tages med det forbehold, at kontakten ikke kan følges et fuldt år efter receptindløsning for alle de 0-17-årige på grund af opgørelsestidspunktet medio 2017. Andelen med kontakt til psykiatrien vil derfor formodentlig være højere ved en eventuel senere opdatering af opgørelsen for 2016.

Tabel 1 Kontakt til psykiatrien¹ for børn og unge (0-17 år) i forbindelse med første receptindløsning på antidepressive lægemidler udskrevet af en alment praktiserende læge², 2010-2016

Kontakt til psykiatrien i forbindelse med første receptindløsning					
År	Antal personer med receptindløsninger (0-17 år)	Kontakt		Ingen	
		Antal	Pct.	Antal	Pct.
2010	1.978	895	45,3	1.083	54,8
2011	1.306	629	48,2	677	51,8
2012	1.006	489	48,6	517	51,4
2013	669	364	54,4	305	45,6
2014	455	269	59,1	186	40,9
2015	308	193	62,7	115	37,3
2016 ³	233	137	58,8	96	41,2

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til 31. december 2016, udtræksdato 17. august 2017), Yderregisteret (opdateringsdato 31. januar 2017), Landspatientregisteret (10. juli 2017) og Sygesikringsregisteret (10. marts 2008-2016 og 10. juli 2017), Sundhedsdatastyrelsen.

Anmærkning: Antidepressive lægemidler er afgrænset til lægemidler i ATC-gruppen N06A, bortset fra bupropion og duloxetin i styrken 20mg og 40 mg, der bruges til stressinkonsistens.

¹Kontakt til psykiatrien omfatter kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen og/eller afregnede ydelser hos privatpraktiserende psykiatere (specialerne 24 og 26).

²Alment praktiserende læger dækker over specialerne 'Almen lægegering', 'Vagtlægehjælp', 'KFA-Vagtordning', 'KAK Vagtlægehjælp'.

³For 2016 er det ikke alle personer, hvis kontakt til psykiatrien efter receptindløsning, kan følges et fuldt år. Dette skyldes, at opgørelsen er lavet ved hjælp af registeropdateringer pr. 10. juli 2017. Fx betyder det, at dem med receptindløsning i oktober 2016 alene følges i en periode fra oktober til 10. juli 2017 og altså mindre end et år."

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Camilla Rosengaard Villumsen