

## Bidrag til samrådsspørgsmål DM (UDDRAG)

Sundheds- og Ældreministeriet har i forbindelse med de kommende tre samråd DI, DJ og DM omhandlende antidepressive lægemidler bedt om at få udvidet Sundhedsdatastyrelsen bidrag af 27. marts 2017 til besvarelse af samråd DM, der lyder:

*”Ministeren bedes redegøre for årsagerne til udviklingen i antallet af børn og unge under 18 år, som får antidepressiv medicin. Ministeren bedes herunder redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i højere grad overholdes således, at færre børn og unge behandles med medicin, og medicin kun anvendes, når andre behandlingsmetoder vurderes at være utilstrækkelige”.*

(...)

Tabel 4 viser hvilken lægetyper, der opstarter nye brugere af antidepressive lægemidler i 2016. Det ses, at andelen af personer, der opstartes af alment praktiserende læger stiger med alderen. Således opstartes 55 pct. af de 18-24-årige og knap 75 pct. af de voksne over 24 år af alment praktiserende læger. Blandt børn i alderen 0-17 år er det en mindre del svarende til 14 pct., der opstartes af alment praktiserende læge. Børnene opstartes hyppigst af hospitalslæge (66 pct.), mens andelen af de 18-24-årige unge hhv. voksne over 24 år, der opstartes af denne hospitalslæge, udgør 29 pct. hhv. 20 pct. Det er relevant at nævne, især for børn og unge, at det ikke ud fra data er muligt at sige noget om, den udskrivende læge har konfereret en speciallæge i børne-og ungdomspsykiatri forud for udskrivning.

Tabel 1 Udskriver af første recept på antidepressive lægemidler, 2016.

Receptudsteder	Aldersgrupper						Hovedtotal	
	0-17 år		18-24 år		25+ år			
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel
Almen lægegering	232	14,4%	3.043	54,7%	26.926	74,3%	30.201	69,6%
Hospitalslæge*	1.055	65,7%	1.587	28,5%	7.202	19,9%	9.844	22,7%
Psykiatri	21	1,3%	702	12,6%	959	2,6%	1.682	3,9%
Neuromedicin	18	1,1%	87	1,6%	512	1,4%	617	1,4%
Erstatningskode	98	6,1%	102	1,8%	327	0,9%	527	1,2%
Andre specialer**	<5	0,1%	22	0,4%	242	0,7%	266	0,6%
Børnepsykiatri	163	10,1%	14	0,3%	-	0,0%	177	0,4%
Tandlægehjælp	-	0,0%	-	0,0%	29	0,1%	29	0,1%
Vagtlægehjælp **	<5	0,1%	<5	0,1%	20	0,1%	24	0,1%
Pædiatri	17	1,1%	-	0,0%	-	0,0%	17	0,0%
Øvrigt/ukendt**	-	0,0%	-	0,0%	14	0,0%	14	0,0%
Misbrugscentre	-	0,0%	-	0,0%	<5	0,0%	<5	0,0%
<b>Hovedtotal</b>	<b>1.607</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.560</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.232</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.399</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret (opdateret til 31. december 2016) og Yderregistret (opdateringsdato 31. januar 2017).

Note: Antidepressive lægemidler er afgrænset som ATC gruppe N06A, bortset fra N06AX12 og N06AX21 i styrken 20mg og 40 mg, der bruges til stressinkonsistens.

Der er 43.390 personer med første receptindløsning på antidepressive lægemidler i 2016, hvoraf personer har første recept fra to forskellige lægetyper, hvorfor summen bliver 43.399.

\* I denne gruppe indgår også de, hvor indberetternummeret fejlagtigt har været forskudt og på den måde oprindeligt har været klassificeret anderledes.

\*\* I gruppe af 'Andre specialer' indgår læger med specialerne: 'Anæstesiologi', 'Dermato-venerologi', Gynækologi-obstetrik', 'Intern medicin', 'Kirurgi', 'Reumatologi (Fysiurgi)', 'Øjenlægehjælp' og 'Ørelægehjælp'.

I gruppen af 'Vagtlægehjælp' indgår 'Vagtlægehjælp', 'KFA-Vagtordning' og 'KAK Vagtlægehjælp'.

I gruppen af 'Øvrigt/ukendt' indgår udover 'Øvrigt/ukendt' også 'Fysioterapi'.

(...)