



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 04-09-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPRSC
Sagsnr.: 1705187
Dok. nr.:

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. juli 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 1022 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 1022:

”Ministeren bedes i forlængelse af ministeriets besvarelse af alm. del spørgsmål 629, 770 og 800 (2016-17) redegøre for, hvor mange færre rygere der vil være i Danmark som helhed og særskilt for grupperne under hhv. 18 år og 15 år, hvis man indførte neutrale cigaretpakker i Danmark.”

Svar:

Som det fremgår af svar på SUU alm. del spørgsmål 629 af 4. april, bestilte det australske sundhedsministerium i forlængelse af indførelsen af standardiserede pakker en analyse med henblik på at vurdere den særskilte effekt af dette tiltag. I analysen opstilles en model, hvor man via historiske data estimerer, hvor stor effekt både befolkningssammensætning, tendensen over tid og f.eks. prisstigninger og kampagner har på rygeprævalensen. Som det også fremgår af svaret på spørgsmål 629, vil der i forbindelse med denne type modellering altid være den usikkerhed, at der kan være faktorer, som ikke er med, eller hvis virkning er anderledes end forudsat. Dertil kommer, at analysen er udarbejdet specifikt for Australien og således ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold.

Til besvarelsen af spm. nr. 1022 har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der oplyser, at der ifølge Danmarks Statistik i 4. kvartal 2016 var 4.784.155 indbyggere i Danmark i aldersgruppen 15+ år. Med en rygeprævalens på 21,1 procent svarer det til, at 1.009.457 personer i Danmark røg i 2016. Rygeprævalensen er baseret på den danske afgrænsning af ”rygere”, da Sundhedsstyrelsen vurderer, at det i denne sammenhæng vil være mest retvisende at medtage det samlede antal rygere, herunder lejlighedsrygere.

Sundhedsstyrelsen estimerer endvidere - under antagelse af, at indførelse af standardiserede cigaretpakker har samme effekt på rygeprævalensen i Danmark som i Australien og med forbehold for ovenstående model-usikkerhed - at rygeprævalensen i 2016 ville have været 20,55 procent, såfremt standardiserede cigaretpakker var indført før 2016 i Danmark. Det svarer ifølge Sundhedsstyrelsen til, at der i Danmark ville have været 26.313 færre rygere i aldersgruppen 15+ år.

Den australske analyse er ikke udspecificeret på aldersgrupper i befolkningen. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det derfor ikke muligt at estimere, hvor mange færre rygere,

der vil være i aldersgrupperne "under 18 år" og "under 15 år", hvis standardiserede pakker blev indført i Danmark.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Rikke Skaarup Schjødt