



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

## Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 14-05-2018  
Enhed: AELSAM  
Sagsbeh.: DEPMRAL  
Sagsnr.: 1802660  
Dok. nr.: 605554

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 19. marts 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 711 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 711:

”Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en risiko en ryger har for at få lungekræft ved et tobaksforbrug på hhv. 20, 10, 5 og 1 daglige cigaretter.”

Svar:

Mit ministerium har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ikke har data til at beregne risikoen for at udvikle lungekræft, som der spørges til i spørgsmålet. I stedet for beregnes risikoen for at dø af lungekræft. Sundhedsstyrelsen bemærker i den forbindelse, at: ”For sygdomme, hvor en stor del af patienterne vil dø af sygdommen, vil risikoen for at få en sygdom og risikoen for at dø af sygdommen være tæt på hinanden. Dødeligheden for lungekræft er høj, f.eks. er kun 13 pct. af mænd og 19 pct. af kvinder med lungekræft i live 5 år efter diagnose. Det vurderes derfor, at beregningen af risikoen for at dø af lungekræft er et godt estimat for risikoen for at få lungekræft.”


Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at:

”Risikoestimerne i Tabel 1, som også er afbilledet grafisk i Figur 2, er beregnet af SIF. Risikoestimerne beskriver risikoen for at dø af lungekræft inden man fylder 75 år, afhængig af det daglige cigaretforbrug.

**Tabel 1: Risiko for at dø af lungekræft**

Antal cigaretter pr. dag	Risiko for at dø af lungekræft inden alder 75 år (procent)	
	Mænd	Kvinder
Aldrig har røget	0,43	0,38
≤ 3	4,5	4,0
4 - 7 (5,5)	3,4	3,1
8 - 12 (10)	5,0	4,5
13 - 17 (15)	5,9	5,3
18 - 22 (20)	8,5	7,6
28 - 32 (30)	11,4	10,3
38 - 42 (40)	13,1	11,7

**Figur 1: Risiko for at dø af lungekræft**



Fortolkningen af risikoestimerne er, antallet af nyfødte børn (ud af 100), der kan forvente at dø af lungekræft inden de fylder 75 år under forudsætning af, at de ikke dør af andet inden. Eksempelvis er risikoen for at dø af lungekræft inden alder 75 år for en kvinde, der ryger 20 cigaretter dagligt, 7,6 pct. og tilsvarende 8,5 pct. for en mand, der ryger 20 cigaretter dagligt. Til sammenligning har kvinder og mænd, der aldrig har røget, hhv. ca. 0,38 pct. og 0,43 pct. risiko for at dø af lungekræft.”

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Maria Ramskov Larsen