



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 23-09-2019
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPMAS
Sagsnr.: 1907062
Dok. nr.: 969423

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 28. august 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 67 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).

Spørgsmål nr. 67:

”Ministeren bedes opgøre antallet af unikke danskere, der er i behandling med psykofarmaka for angst og depression og i samtidig terapi, hhv. samtalerapi hos almen praksis og psykologbehandling med lægehenvielse? Tallene bedes opgøres særskilt for årene 2010-2018 og i aldersintervaller.”

Svar:

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, som jeg henholder mig til:

”Sundhedsdatastyrelsen har som bidrag til besvarelse af spørgsmålet udarbejdet en opgørelse på baggrund af data i Lægemiddelstatistikregisteret for perioden 2010-2017. Derudover er data i Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret anvendt for perioden 2008-2018.

Opgørelsen angiver nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning er behandlet i sundhedsvæsenet. Det betyder for eksempel, at en person med første receptindløsning den 30. april 2017 vil indgå i opgørelsen for 2017, hvis personen er blevet behandlet i sundhedsvæsenet i perioden fra den 30. april 2015 til den 30. april 2018.

Behandling i sundhedsvæsenet dækker over samtalerapi hos en alment praktiserende læge og behandling hos privatpraktiserende psykolog. Derudover indgår kontakt til privatpraktiserende psykiatere samt behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling, da samtidig terapi også kan modtages der. Behandling ved privatpraktiserende psykiatere og psykologer omfatter alt afregnet aktivitet under den offentlige sygesikring inden for de udvalgte specialer og den afgrænsede periode. Herunder fx ydelsen *telefonisk rådgivning af alment praktiserende læge* afregnet under specialet børne- og ungdomspsykiatri.

Nye brugere er personer, der har første receptindløsning i et givent år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på et lægemiddel indløses siden 1996. En person vil kun tælle med i opgørelsen, hvis personen har første receptindløsning på et lægemiddel mod angst og depression i et givent år i perioden 2010-2017. En person vil derfor kun tælle med én gang i perioden. Nye brugere er valgt for, at en person ikke tæller med som både behandlet og ikke behandlet i sundhedsvæsenet i forbindelse med forskellige receptindløsninger.

Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdagen.

Opgørelsen dækker over perioden 2010-2017 og ikke til 2018, da behandling i sundhedsvæsenet et år efter første receptindløsning i 2018 ikke kan opgøres, idet årsopgørelsen for 2019 ikke er klar endnu.

Bidraget indeholder følgende tabeller:

- Tabel 1: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der får samtaleterapi hos en alment praktiserende læge, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017
- Tabel 2: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017
- Tabel 3: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet på en psykiatrisk hospitalsafdeling, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017
- Tabel 4: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017
- Tabel 5: Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet i sundhedsvæsenet, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017

Tabel 1 viser bl.a., at 293 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 0-17 år i 2017 modtager samtaleterapi hos alment praktiserende læger inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 23 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen.

Tabel 1 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der får samtaleterapi hos en alment praktiserende læge, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	0-17 år	1.341	874	759	567	428	371	327	293
	18-24 år	4.820	3.879	3.542	2.762	2.393	2.264	2.134	2.254
	25-39 år	8.592	6.333	5.804	4.371	3.573	3.868	3.647	3.749
	40-64 år	10.104	7.327	6.759	5.201	4.156	4.547	4.296	4.126
Antal unikke personer	65+ år	3.014	2.052	1.939	1.595	1.465	1.608	1.607	1.599
	0-17 år	45	38	36	32	29	25	25	23
	18-24 år	54	51	50	48	47	46	45	45
	25-39 år	54	50	51	48	48	48	49	49
Andel unikke personer (pct.)	40-64 år	48	44	43	42	41	43	43	42
	65+ år	19	16	17	17	17	17	19	18

Anm.: Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning modtager samtaleterapi hos en alment praktiserende læge (ydelseskoderne 6101, 6201, 4003, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4063, 4106, 4247, 4248, 4249 under praksisspeciale 80). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden 1996. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen med samtaleterapi ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænset til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg.

Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019 og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 2 viser bl.a., at 1.265 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 18-24 år i 2017 bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 25 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen.

Tabel 2
Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykolog, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-17 år	476	366	330	273	188	171	117	110
18-24 år	2.784	2.577	2.346	1.838	1.568	1.496	1.240	1.265
25-39 år	4.981	4.059	4.014	2.997	2.416	2.558	2.181	2.196
40-64 år	2.685	2.166	2.746	2.730	2.283	2.424	2.168	1.961
Antal unikke personer	65+ år	438	381	479	513	518	572	557
0-17 år	16	16	16	16	13	11	9	9
18-24 år	31	34	33	32	31	30	26	25
25-39 år	31	32	35	33	32	32	29	29
40-64 år	13	13	18	22	23	23	22	20
Andel unikke personer (pct.)	65+ år	3	3	4	5	6	7	6

Anm.: Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling hos en privatpraktiserende psykolog (praksisspeciale 63). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden 1996. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen hos en privatpraktiserende psykolog ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg.

Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019 og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 3 viser bl.a., at 2.609 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 25-39 år i 2017 bliver behandlet på en psykiatrisk afdeling inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 34 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen.

Tabel 3
Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet på en psykiatrisk hospitalsafdeling, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-17 år	1.635	1.427	1.399	1.284	1.194	1.266	1.101	1.082
18-24 år	2.893	2.608	2.656	2.391	2.409	2.668	2.751	2.957
25-39 år	2.965	2.575	2.506	2.245	2.216	2.405	2.465	2.609
40-64 år	2.706	2.446	2.379	2.259	2.002	2.193	2.156	2.049
Antal unikke personer	65+ år	2.271	1.948	1.662	1.541	1.482	1.591	1.472
0-17 år	55	62	67	73	80	85	84	84
18-24 år	32	34	38	41	48	54	58	59
25-39 år	19	20	22	25	30	30	33	34
40-64 år	13	15	15	18	20	21	22	21
Andel unikke personer (pct.)	65+ år	15	16	15	16	17	17	17

Anm.: Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling (hospitalspeciale 50 og 52). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden 1996. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen på en psykiatrisk hospitalsafdeling ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg.

Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019 og Landspatientregisteret pr. 10. juni 2019, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 4 viser bl.a., at 1.094 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 40-64 år i 2017 bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 11 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen.

Tabel 4 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet hos en privatpraktiserende psykiater, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal unikke personer	0-17 år	546	377	355	299	285	256	266	214
	18-24 år	1.212	1.002	983	790	744	967	1.313	1.523
	25-39 år	1.854	1.435	1.287	996	838	1.033	1.137	1.212
	40-64 år	2.097	1.668	1.499	1.177	880	1.072	1.100	1.094
	65+ år	310	329	259	253	172	221	216	198
Andel unikke personer (pct.)	0-17 år	18	16	17	17	19	17	20	17
	18-24 år	13	13	14	14	15	20	28	30
	25-39 år	12	11	11	11	11	13	15	16
	40-64 år	10	10	10	10	9	10	11	11
	65+ år	2	3	2	3	2	2	3	2

Anm.: Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling hos privatpraktiserende psykiatere (børne- og ungdoms-psykiatri: praksisspeciale 26 og psykiatri: praksisspeciale 24). Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden 1996. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen hos en privatpraktiserende psykiater ikke nødvendigvis er relateret til recept-indløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg.

Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019 og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 5 viser bl.a., at 3.126 nye brugere af lægemidler mod angst og depression på 65 år og derover i 2017 modtager samtalerterapi hos en alment praktiserende læge, behandling hos privatpraktiserende psykolog, psykiater eller behandling på en psykiatrisk hospitalsafdeling inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning. Det svarer til 36 pct. af alle nye brugere i aldersgruppen.

Tabel 5 Nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der bliver behandlet i sundhedsvæsenet*, opdelt på aldersgrupper, 2010-2017									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal unikke personer	0-17 år	2.570	1.968	1.861	1.582	1.412	1.419	1.242	1.225
	18-24 år	7.205	6.181	5.826	4.764	4.208	4.296	4.182	4.439
	25-39 år	12.089	9.476	8.773	6.890	5.760	6.152	5.870	5.995
	40-64 år	13.112	10.108	9.688	7.907	6.458	6.929	6.579	6.250
	65+ år	5.325	4.081	3.673	3.261	3.034	3.316	3.174	3.126
Andel unikke personer (pct.)	0-17 år	86	86	89	91	94	95	94	95
	18-24 år	80	81	83	82	84	87	89	88
	25-39 år	76	75	76	76	77	77	78	79
	40-64 år	62	60	62	64	64	65	66	64
	65+ år	34	33	33	34	35	36	37	36

Anm.: *Behandling i sundhedsvæsenet omfatter følgende:
- Samtalerterapi hos en alment praktiserende læge (ydelseskoderne 6101, 6201, 4003, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4063, 4106, 4247, 4248, 4249 under praksisspeciale 80).
- Behandling hos privatpraktiserende psykolog med tilskud (praksisspeciale 63).
- Behandling hos privatpraktiserende psykiater (børne- og ungdomspsykiatri: praksisspeciale 26 og psykiatri: praksisspeciale 24).
- Behandling på en offentlig eller privat psykiatrisk hospitalsafdeling (hospitalsspeciale 50 og 52).
Tabellen omfatter nye brugere af lægemidler mod angst og depression, der inden for en periode fra to år før og et år efter første receptindløsning modtager behandling i sundhedsvæsenet.

Nye brugere er personer, der har første receptindløsning det givne år. Første receptindløsning defineres som første dag, en recept på lægemidler mod angst og depression indløses siden 1996. Der er afgrænset til nye brugere, der har dansk bopælskommune på receptindløsningsdatoen. Det bemærkes, at behandlingen i sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression. Lægemidler til behandling af angst og depression er afgrænset til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI). SSRI er afgrænset til ATC-gruppe N06AB. SNRI afgrænses til venlafaxin (ATC-kode N06AX16) og duloxetin (ATC-kode N06AX21) bortset fra styrke 20 og 40 mg. Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 28. februar 2019, Landspatientregisteret pr. 10. juni 2019 og Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Lægemiddelstatistikregisteret er anvendt til at identificere personer, der har indløst recepter på psykofarmaka til behandling af angst og depression. Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen afgrænset psykofarmaka til behandling af angst og depression til selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin genoptagelseshæmmere (SNRI).

Det bemærkes, at behandlingen i sundhedsvæsenet ikke nødvendigvis er relateret til receptindløsningen på et lægemiddel mod angst og depression.

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen besluttet at afgrænse perioden, hvor brugere af lægemidler mod angst og depression behandles i sundhedsvæsenet som to år før og et år efter første receptindløsning i opgørelsesåret. Denne afgrænsning er valgt bl.a. for at tage højde for, at recepter kan ligge to år på apotekets receptserver, før de indløses, og at der kan være ventetider på fx psykologbehandling.

Tabel 1-4 summerer ikke til tabel 5. Det skyldes, at en person kan modtage flere slags behandlinger i sundhedsvæsenet i perioden 2010-2017. Personen kan derfor optræde i flere af tabellerne 1-4. I tabel 5 indgår nye brugere kun én gang svarende til første receptindløsning på tværs af de udvalgte behandlinger. Tabel 5 dækker derfor over personer, der har modtaget mindst én type behandling i sundhedsvæsenet.”

. / . Jeg henviser i øvrigt til besvarelsen af SUU alm del nr. 68 for øvrige bemærkninger til opgørelserne.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Maja Sørensen